

## HOLD ØJE MED SKULPESNUDEBILLER I VINTERRAPS FRA BLOMSTRING

STØTTET AF

### Promilleafgiftsfonden for landbrug

Kraftige angreb i 2015 er ikke ensbetydende med kraftige angreb i år, men ifølge svenske angivelser kan der være en forøget risiko for angreb i år.

I 2015 var der som bekendt mange skulpesnudebiller i vinterrapsen. Se yderligere i [PlanteNyt nr. 2155](#).


I 2016 behøver der ikke af den grund komme mange skulpesnudebiller, men ifølge svenske angivelser kan der være en forøget risiko for angreb i år. Hold derfor øje med udviklingen. Planterne er modtagelige for angreb fra begyndende blomstring.

Den første melding om angreb er i dag modtaget fra en mark, hvor kun relativ få blomster var sprunget ud. Se billede 1 nedenfor.

Bekæmpelse anbefales fra blomstring ved **6** 1-2 skulpesnudebiller pr. plante. Undersøg alle blomster på en plante, og pas på ikke at ryste planterne før undersøgelse, da skulpesnudebillerne let falder af.

Til bekæmpelse kan anvendes godkendte pyrethroider. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 2262](#), hvor normaldoserne er vist i tabel 1, og der anbefales 50-75 procent dosis. Den angivne dosis af Fastac anbefales dog ikke reduceret.


Af de anbefalede midler må kun Mavrik udsprøjtes hele døgnet under blomstring, mens de øvrige midler kun må udsprøjtes udenfor biernes flyvetid, dvs. i perioden ca. kl.21-03. Tjek altid marken for bier før sprøjtning.





**Billede 1.** I denne vinterrapsmark blomstrer kun ganske få planter, men alligevel er der allerede mange skulpesnudebiller.

Foto fra 2. maj: Mads Brandt, Landbrugsrådgivning Syd.



**Billede 2.** Nærbillede af skulpesnudebille i rapsblomst på den nyudviklede skulpe.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.