



LYS BLADPLET BREDER SIG FORTSAT I MANGE VINTERRAPSMARKER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ved svampebekæmpelse under blomstring skal der ved friske angreb af lys bladplet vælges midler, som også har god effekt mod lys bladplet.

Som bekendt er svampesygdommen lys bladplet mere udbredt end normalt i vinterraps i år. Se også [PlanteNyt nr. 2283](#). Det er usædvanligt, at svampen optræder i så mange marker og så udbredt. Sidst der optrådte så udbredte angreb af lys bladplet i Danmark var i 1995.

Den milde og fugtige vinter og det fugtige og kølige forår har fremmet svampen.

På nuværende tidspunkt ses friske angreb på de øvre blade i flere marker, og der er risiko for angreb på knopperne. Se billede 1-14 nedenfor fra 18. april.

Svampen kan ved kraftige angreb angribe knopper og skulper og derved være meget tabsvoldende. I UK er lys bladplet den vigtigste svampesygdom i vinterraps, og i mange forsøg med kraftige angreb er der opnået over 10 hkg/ha i merudbytte for bekæmpelse. I 1995 optrådte også store udbyttetab i marker med kraftige angreb i Danmark.

Erfaringerne fra UK er, at hvis svampen er veletableret, er det svært at opnå god effekt, fordi svampemidlerne ikke er så kurative.

Det antages, at bekæmpelse af lys bladplet nu er udført i marker med udbredte angreb. Der er ikke nogen fast bekæmpelsestærskel, men bekæmpelse anbefales ved over 20-25 procent angrebne planter. Hvis der er kraftige angreb og endnu ikke udført bekæmpelse og ikke udsigt til fuld blomstring (st. 65) indenfor ca. 8 dage, udføres bekæmpelse nu.

VALG AF SVAMPEMIDDEL UNDER BLOMSTRING

I mange marker skal der under blomstring tages stilling til evt. svampebekæmpelse rettet mod knoldbægersvamp og skulpesvamp, hvor der oftest opnås bedst effekt under fuld blomstring i st. 65 (50-60 procent af blomsterne på hovedskuddene er åbne). Se yderligere i PlanteNyt nr. 2263.

Hvis der er friske angreb af lys bladplet på de øvre blade under blomstring, er der også behov for bekæmpelse af lys bladplet.

Mod lys bladplet har følgende midler bedst effekt: Orius, Folicur Xpert og Prosaro. Midlerne får 3 stjerner på en 0-4 skala. Herefter kommer Juventus med 2,5 stjerner og Eflor med 2 stjerner.

Der anbefales mod lys bladplet 50-75 procent dosering afhængig af angrebsgrad, dvs. 0,625-0,95 l Orius, 0,5-0,75 l Folicur Xpert eller 0,5-0,75 l Prosaro.

Mod de øvrige svampe anbefales 70 procent normaldosering under blomstring, som angivet i ovennævnte plantenyt. Hvis der f.eks. ønskes anvendt 0,35 l Amistar + 0,45 l Orius mod øvrige svampe, anvendes ved betydende angreb af lys bladplet i stedet 0,35 l Amistar + (0,625 -0,95) l Orius eller der vælges udelukkende 0,9 l Orius eller udelukkende 0,75 l Folicur Xpert/ Prosaro, hvis triazolreglerne og de øvrige regler tillader det. Se nedenfor.

For Orius gælder: må kun anvendes enten efterår eller forår. Forår maks. 1,25 l. 1,0 l indeholder 200 g tebuconazol.

For Folicur Xpert gælder: maks. 2 x 0,78 l dog kun maks. 1,1 l, hvis behandlet med Folicur Xpert efterår. 1,0 l indeholder 160 g tebuconazol.

For Prosaro gælder: Maks. 2 behandlinger pr. sæson med minimum 14 dages mellemrum. Maks. 2,0 l pr. sæson, dog kun maks. 1,4 l hvis behandlet med Prosaro efterår. Maks. 1,0 l pr. behandling. 1,0 l indeholder 125 g tebuconazol.

HUSK TRIAZOLREGLERNE

Orius, Folicur Xpert og Prosaro tæller med i triazolreglerne. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 1183](#). Hvis der er anvendt Orius, Folicur Xpert eller Prosaro efterår må der hele sæsonen maks. anvendes 175 g tebuconazol. Hvis det ikke er tilfældet, må der hele sæsonen anvendes i alt 250 g tebuconazol.

Svampen hedder light leaf spot på engelsk og på latin *Cylindrosporium concentricum* og det kønnede stadie *Pyrenopeziza brassicae*, såfremt man ønsker at søge yderligere oplysninger på nettet.





Billede 1. Angreb af lys bladplet i bestand.



Billede 2. Angreb af lys bladplet har bevæget sig opad planten.



Billede 3. Lys bladplet på nedre blade.



Billede 4. Nærbillede af lys bladplet. Vævet er her indtørret og krakelerer.



Billede 5. På stængler og bladstilke kan se brune tørre områder, som er angreb af lys bladplet.





Billede 6. Lys bladplet på øvre blade.



Billede 7. Lys bladplet på øvre blade.




Billede 8. Lys bladplet på øvre blade.




Billede 9. Lys bladplet på øvre blade.



Billede 10. Lys bladplet på øvre blade.





Billede 11. Lys bladplet på øvre blade.



Billede 12. Lys bladplet på øvre blade.



Billede 13. Lys bladplet på blad ved knop. Det angrebne blad krøller.



Billede 14. Angreb af lys bladplet på knopper.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.