



VÆKSTREGULERINGSMIDLET MEDAX TOP ER REVURDERET

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Miljøstyrelsen har revurderet midlet, og der er udelukkende sket ændringer for anvendelsen i havre.

Medax Top er fortsat godkendt til anvendelse i hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs. Midlet må anvendes i vækststadium 30- 39 i korn, rødsvingel, strandsvingel og hundegræs. I rajgræs må midlet anvendes i vækststadium 30- 49. Behandlet græs må ikke anvendes til foder. Der er ingen afstandskrav til vandløb.

I havre må der nu maksimalt anvendes 0,75 liter pr. ha. pr. sæson. Er der forudgående anvendt et andet vækstreguleringsmiddel i havre bør der ikke anvendes Medax Top.

I vinterhvede, vinterbyg, triticale, vinterrug, vårbyg, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs må der maksimalt anvendes 1,5 liter pr. ha. pr. sæson. I vårhvede må der maksimalt anvendes 1,0 liter pr. ha. pr. sæson.

Medax Top indeholder aktivstofferne prohexadion-calcium og mepiquat-chlorid.

Læs mere i [Middeldatabasen](#) om [Medax Top](#).