



SVAMPEBEKÆMPELSE I STRANDSVINGEL

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Hold især øje med bladplet.

Strandsvingel kan angribes af bladplet og meldug. Bladplet vurderes som den mest tabsvoldende af svampene. Bladplet optræder i fugtige år.

BEKÆMPELSESTÆRSKLER

Bekæmpelsestærsklerne er ikke særlig godt belyst, men bekæmpelse anbefales, når nedenstående tærskler overskrides.

Bladplet bekæmpes fra begyndende strækning til gennemskridning (st. 32-59) ved over 0,5 procent dækning (højst en læsion pr. skud), hvis der er fugtige forhold.

Meldug bekæmpes fra begyndende strækning til begyndende skridning (st. 32- 51) ved over 1,0 procent dækning (få læsioner på nedre blade). Tidlige angreb før strækning kan forekomme, men udløser ikke bekæmpelse.


Rust optræder relativt sjældent, men bekæmpes ved mere udbredte angreb.

OPNÅEDE MERUDBYTTER

I figur 1 er bruttomerudbytterne i landsforsøgene med svampebekæmpelse siden 2005 sammenstillet. Forsøgene er sprøjtet ca. midt i maj med 0,25 l Zenit 575 EC + 0,25 l Amistar (indtil 2010, Zenit må ikke længere opbevares eller anvendes) eller med 0,375 l Bell + 0,15 l Comet/0,3 l Comet Pro (2011-2015).

Sættes omkostningerne til svampemidler og udbringning til 300 kr. og frøprisen til 8,0 kr. pr. kg, så er omkostningerne til sprøjtning 38 kg pr. ha. I ca. 40 procent af forsøgene er der opnået

rentable merudbytter ved disse omkostninger. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte er 4 kg pr. ha. Som det fremgår, er der opnået meget varierende merudbytter for bekæmpelse, og i forsøgene med merudbytter har der i mange tilfælde ikke været tale om sikre merudbytter.



Figur 1. Opnåede bruttomerudbytter for svampesprøjtning i strandsvingel, 23 landsforsøg, 2005-2013.

BEKÆMPELSE

I tabel 1 ses [løsningsforslag](#) ved svampebekæmpelse i strandsvingel. Af de afprøvede midler i forsøgene, har der ikke været nogen løsninger, der har klaret sig klart bedre end andre. Ved behov er en enkelt behandling oftest tilstrækkelig. I tabel 1 er der angivet en dosering på 30-40 procent af normaldoseringen. Til bekæmpelse af bladplet kan f.eks. anvendes Bell, Bell+Comet Pro eller Amistar/Aproach + Orius omkring begyndende skridning. Til meldugbekæmpelsen kan anvendes Orius eller evt. Ceando.

Vær opmærksom på, at flere af midlerne som angivet har restriktioner i antallet af tilladte behandlinger pr. vækstsæson.

REGLER FOR BRUG AF VISSE TRIAZOLER

Vær opmærksom på reglerne for den maksimalt tilladte mængde, som man må bruge af visse triazoler. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 1183](#).

OPFODRING

Kun frøgræshalm behandlet med Amistar/Mirador. Vær opmærksom på, at frøgræshalm behandlet med Orius ikke længere må opfodres, hvis der er en ny etikette på Orius.



Billede 1. Angreb af bladplet i strandsvingel.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.