



SVAMPEBEKÆMPELSE I ENGRAPGRÆS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Hold især øje med rust.

Engrapgræs kan angribes af rust, meldug og rød øjeplet, hvor rust er mest tabsvoldende. Engrapgræs angribes både af rapgræsrust/lundrapgræsrust og gulrust.

Meldug kan til tider også udløse en bekæmpelse, mens rød øjeplet normalt ikke bekæmpes. Med hensyn til meldugangreb, er der forskel på plæne- og fodertyperne, ligesom der er en betydelig sortsvariation. Fodertyperne skades generelt mindre end plænetyperne.

BEKÆMPELSESTÆRSKLER

Bekæmpelsestærsklerne er ikke særligt godt belyst, men bekæmpelse anbefales, når nedenstående tærskler overskrides.


- Rust bekæmpes ved over 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante) fra begyndende strækning til gennemskridning (st. 32-59).
- Meldug bekæmpes ved over 0,5 procent dækning (få kolonier pr. skud) i plænetyperne og over 1 procent dækning (en del kolonier pr. skud) i de kraftigt voksende fodertyper fra begyndende strækning indtil skridning (st. 32-45).

OPNÅEDE MERUDBYTTER

I figur 1 er bruttomerudbytterne i landsforsøgene med svampebekæmpelse siden 1992 sammenstillet. Forsøgene er sprøjtet omkring midten af maj. Mange af forsøgene er sprøjtet med Amistar + Orius.

Sættes omkostninger til svampemidler og udbringning til 200 kr. og frøprisen til 14,0 kr. pr. kg,

er omkostningerne til sprøjtning 14 kg frø. I ca. 50 procent af forsøgene er der opnået rentable merudbytter ved disse omkostninger. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte er 23 kg frø pr. ha.



Figur 1. Opnåede bruttomerudbytter for svampesprøjtning i engrapgræs, 37 landsforsøg 1992-2014.

I [tabel 1](#) ses løsningsforslag ved svampebekæmpelse i engrapgræs. Der er angivet 30-40 procent af normaldoseringen. I forsøgene har der ikke været forskel på effekten af de angivne løsninger, hvorfor de billigste løsninger anbefales, dvs. Orius.

Amistar/Mirador/Aproach er ikke medtaget i løsningerne, da midlerne har svag effekt på engrapgræsrust. Mod gulrust vurderes effekten at være bedre.

REGLER FOR BRUG AF VISSE TRIAZOLER

Vær opmærksom på reglerne for den maksimalt tilladte mængde, som man må bruge af visse triazoler. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 1183](#).

OPFODRING

Kun frøgræshalm behandlet med Amistar/Mirador må opfodres. Vær opmærksom på, at frøgræshalm behandlet med Orius ikke længere må opfodres, hvis der er en ny etikette på Orius.





Billede 1. Engrapgræsrudd. Sporerne sidder spredt.





Billede 2-3. Gulrust i engrapgræs. Så længe sporehobene ikke sidder i striber, kan det være svært at afgøre, om der er tale om engrapgræsrust eller gulrust. Her sidder sporehobene i striber.



Billede 4. Rød øjeplet.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.