



TJEK TRITICALE FOR EVT. ANGREB AF GULRUST

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er i flere tilfælde fundet gulrust i triticale

Der er i flere tilfælde fundet gulrust i triticale. Nedenstående foto er fra 7. april fra en triticaemark ved Møgeltønder i Sønderjylland. Sorten er Ragtac, og alle planter i marken er angrebet. Tjek derfor triticaemarkerne for evt. angreb.

Se yderligere om svampebekæmpelse i triticale i [PlanteNyt nr. 2231](#). Det fremgår, at de dyrkede sorter er ekstrem modtagelige (Ragtac) til meget gulrustmodtagelige (Tantris, Jura, Toledo, Gringo).

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter ved konstateret forekomst eller såfremt der findes gulrust i triticale i området. Bekæmpelse iværksættes fra omkring vækststadiet 30 (begyndende strækning af hovedskud), hvor der er nyvækst, som ønskes beskyttet. En rettidig indsats er i modtagelige sorter en forudsætning for en effektiv bekæmpelse. Rettidighed har større betydning end doseringen.

Inkubationstiden (tiden fra smitte til symptomer ses) for gulrust er ved 9° C ca. 24 dage og ved 20° C ca. 12 dage.





Billede 1. Angreb af gulrust i tritcale. Foto: Ole B. Hansen, Landbrugsrådgivning Syd.



Billede 2. Nærbillede af gulrust i tritcale.