



UNDERSØG RAPSEN FOR ANGREB AF LYS BLADPLET NU

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der findes ingen vejledende bekæmpelsestærskel, men bekæmpelse anbefales ved mere udbredte angreb, og hvis der kan ses friske angreb på nyere blade. Anvend f.eks. 0,625 l Orius eller 0,5 l Prosaro. Bemærk reglerne for midlernes anvendelse.

Der er meldt om angreb af lys bladplet (*Cylindrosporium concentricum*) i nogle vinterrapsmarker. I nogle marker optræder der ret udbredte angreb. Undersøg derfor rapsmarkerne for evt. angreb.

Den milde vinter og den megen nedbør har fremmet angreb. Svampen trives bedst i milde og fugtige vintre samt i kølige og fugtige forår. Infektion kan ved 5-15 °C og fugtige forhold ske indenfor 5 dage.

Der er forskelle i sorternes modtagelighed, men for de fleste af de i Danmark dyrkede sorter findes der ikke officielle data. På den tyske sortliste fra BSA findes ikke data for lys bladplet og på [Recommended List](#) fra UK (lys bladplet = light leaf spot) er der kun data for enkelte af de i Danmark dyrkede sorter.

SYMPTOMER

Se billede 1-9 af angreb fra 4. april nedenfor. På bladene ses hvidlige til grålige områder, og under fugtige forhold ses små hvide "punkter" (sporer) i kanten af det angrebne område. Svampen får overhuden på bladene til at krakelere og se indtørret ud. Hvis bladranden eller bladribberne angribes, ændrer væksten sig, og der opstår bøjninger eller krusninger på bladet. Stænglerne kan også angribes.

Symptomerne kan til tider forveksles med svidninger fra gødningskorn.

Ved kraftige angreb kan knopper og skulper angribes, hvorved knopperne visner eller der opstår deforme og nødmodne skulper samt skulpeopspring. Svampen kan herved være meget tabsvoldende.

BEKÆMPELSE

Der findes ingen vejledende bekæmpelsestærskel, men bekæmpelse anbefales ved mere udbredte angreb, og hvis der kan ses friske angreb på nyere blade. Anvend f.eks. 0,625 l Orius eller 0,5 l Prosaro. Bemærk reglerne for midlernes anvendelse nævnt nedenfor.

Folicur Xpert, Orius og Prosaro har bedst effekt mod lys bladplet og har alle 3 stjerner på en 0-4 skala. Herefter kommer Juventus (2,5 stjerner) og Efilor (2 stjerner). Ingen af midlerne har lys bladplet nævnt på etiketten. Folicur Xpert, Orius og Prosaro må anvendes mod gråskimmel eller rodhalsrød fra st. 31 (begyndende strækning).

For Folicur Xpert gælder: må maks. anvendes med 0,32 l/ha i st. 31-32 (hvis der er behandlet i efteråret må den samlede mængde ikke overstige 1,1 l/ha). Maks. 2 behandlinger pr. sæson.

For Orius gælder: må kun benyttes efterår eller forår. Forår maks. 1,25 l/ha.

For Prosaro gælder: Maks. 2 behandlinger pr. sæson og min. 14 dage mellem to behandlinger. Hvis der er behandlet i efteråret, må den samlede mængde ikke overstige 1,4 l/ha.

Bemærk også reglerne for maks. anvendelse af visse triazoler. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 1183](#).



Billede 1. En stor del af bladet er angrebet af lys bladplet.





Billede 2. Lys bladplet. Angreb kan til tider forveksles med svidninger fra gødningskorn.



Billede 3. To blade angrebet af lys bladplet.





Billede 4. Begyndende angreb af lys bladplet på bladpladen og i bladspidsen.



Billede 5. Fire pletter af lys bladplet på blad.



Billede 6. Bladnerve angrebet af lys bladplet. Bladet vokser skævt videre.





Billede 7. Bladnerve angrebet af lys bladplet. Bladet vokser skævt videre.



Billede 8. Bagside af blad angrebet af lys bladplet.





Billede 9. Begyndende friske angreb. Bemærk de små hvide "punkter", som er sporer og især ses under fugtige forhold.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.