



SVAMPEBEKÆMPELSE I ÆRTER TIL MODENHED

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Svampebekæmpelse i ærter anbefales generelt ikke, da bekæmpelse kun meget sjældent er rentabel. Dette gælder også i fremavlsærter. Kun i ekstremt fugtige år kan sprøjtning i tiden omkring fuld blomstring være aktuel.

I fremavlsærter kan spireevnen i ekstremt fugtige år til tider blive forbedret ved svampesprøjtning. I ældre forsøg i det meget fugtige år 1987 blev spireevnen forbedret med seks procent ved svampesprøjtning.

Fremavlsærter kan også blive kasseret på grund af for meget ærtesyge på de høstede frø, men her vil en svampesprøjtning kun yderst sjældent reducere angrebet til under den vejledende grænseværdi.

Da der ikke findes godkendte bejdsemidler til ærter i Danmark, må fremavlsærter - for at blive godkendt til udsæd - indeholde maks. 5 procent frø med ærtesyge. Ærteudsæd beregnet til helsæd må indeholde maks. 10 procent frø med ærtesyge. Disse vejledende grænseværdier bliver meget tit overskredet, og det er ikke usædvanligt, at over halvdelen af partierne overskrider grænseværdierne.

Landsforsøg i 2004-06 med svampesprøjtning med forskellige midler har ikke reduceret angrebet af ærtesyge i de høstede frø og har heller ikke forbedret spireevnen. Se landsforsøg med svampebekæmpelse i ærter i [tabellen](#) fra Oversigt over Landsforsøgene 2006 side 146 (udregn selv nettomerudbytter med de i dag gældende priser). I forhold til ærtesyge på frøene lykkes fremavl af ærter derfor bedst i områder med relativt tørre somre, og hvor høsten ikke bliver forsinket.

LØSNINGSFORSLAG

Her ses [løsningsforslag](#), hvis svampebekæmpelse undtagelsesvis er aktuelt. Der er angivet 25-

50 procent normaldosís af **Amistar**, **Mirador 250 SC**, og **Signum WG**, og 50 procent af normaldosís for **Ortiva Top** og **Switch 62,5 WG**. Den lave dosis af Amistar, Mirador 250 SC, og Signum WG anvendes sáfremt behandlingen deles i to behandlinger. Der er angivet normaldosís for Dithane NT. Dithane NT er ikke længere markedsfórt, et eventuelt restlager må anvendes indtil 7. juni 2017.

Kóreskaden i ærter omkring blomstring er ca. 1,5 procent af udbyttet med en 24 meter markspróje.

Der bør anvendes omkring 200 l vand pr. hektar. F.eks. kan der anvendes (025 refleks/lavdriftdyse, 3,5 atm. og 6,5 km/t) eller (030 refleks/lavdriftdyse, 3,0 atm. og 7,0 km/t) eller (040 refleks/lavdriftdyse, 2,0 atm. og 8,0 km/t).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.