

ANGREB AF AKSLØBERENS LARVE I VINTERSÆD

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Angrebene er ret stedbundne og optræder derfor ofte i de samme områder.

Der er de seneste dage meldt om angreb af aksløberens larve i vintersæd i nogle tilfælde på Sjælland og Langeland. Se billeder. Angrebene er ret stedbundne og optræder derfor ofte i de samme områder.

Larverne angriber vintersæd og vårsæd (havre er ikke så attraktiv) samt frøgræs og anden græs. Gnavene fortsætter lang tid i efteråret og genoptages til foråret, hvor de fortsætter til og med maj måned.

De voksne aksløbere lægger æg i spildkorn og græsser i stubmarken i august-september. Der kan forekomme kraftige angreb, hvis det er meget varmt og tørt i denne periode, fordi der herved er gode æglægningsbetingelser, ligesom de første larvestadier er meget påvirket af temperatur og fugtighed.

Det kan være svært at finde larverne i marken, fordi de lever i 30-40 cm lange "rør" i jorden, som de selv har bygget. De forlader rørene om natten for at komme frem til overfladen og æde af planterne. Hvis man graver med en spade, kan man dog godt finde larverne.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,3-0,45 l Avaunt, der har en såkaldt "mindre anvendelse" til bekæmpelse af aksløberens larve.

Se nærmere om symptomer, biologi og bekæmpelse i [Artikel 2105](#) og [Artikel 2129](#).





Billede 1. Aksløberens larver.



Billede 2. Gnav efter aksløberens larve.





Billede 3. Gnav efter aksløberens larve.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.