



ANGREB AF STANKELBENLARVER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er meldt om angreb af stankelbenlarver i flere marker. Majs og ærter er de mest robuste afgrøder mod stankelbenangreb. Der er ingen muligheder for bekæmpelse om foråret.

Den seneste uge er der meldt om tilfælde af kraftige angreb af stankelbenlarver i flere græsmarker. Ved såning af en ny afgrøde efter græs er der risiko for angreb. Der er ikke kemiske løsninger til rådighed til bekæmpelse af stankelben om foråret.

Miljøstyrelsen har i tidligere år givet dispensation til brug af Danadim Progress (dimethoat) i græs, men grundet den nye afgift blev prisen for en bekæmpelse for høj nemlig over 2100 kr./ha. Siden er der givet en mindre anvendelse til at bruge 0,45 l/ha Avaunt i græs om efteråret. Se yderligere i PlanteNyt nr. 1898, 2014. Forårsanvendelse er ikke søgt, fordi der ikke foreligger forsøg med betydende effekt, og fordi tyske erfaringer tyder på for ringe effekt ved forårsanvendelse. Dette skyldes sikkert, at larverne er større om foråret end om efteråret og derfor er sværere at bekæmpe.

Der kan desværre ikke anvises andre alternative metoder med væsentlig effekt. Tromling har en vis effekt, men der er meget blandede tilbagemeldinger fra praksis hermed.

UDSATTE MARKER

Stankelbenene ligger æg i græs i august til primo september. Kort græs foretrækkes. Angreb er derfor knyttet til græsdyrkning i august til primo september.

Normalt findes der flest stankelben i 2. og 3. års græsmarker, der har været afgræsset. Larverne er mest udbredt på humus-, sand- og marskjorder.

HVORNÅR KAN DER SÅS OM?

Stankelben forpupper sig normalt omkring Sankt Hans, og aktiviteten aftager omkring Grundlovsdag. Omsåning kan derfor ske fra omkring første uge af juni.

Alle afgrøder angribes, men erfaringerne er, at majs og ærter er mere robuste end de øvrige afgrøder. Hvis der omsås med majs, kan der sås til normal tid, fordi afgrøden er mere robust, men der vil også komme angreb i mindre omfang i majs.

I majs har bejdsemidlet Sonido tidligere været solgt, men udbydes ikke længere. Midlet har nogen effekt på både smelder- og stankelbenlarver. En stor ulempe ved bejdsen var dog, at der ikke samtidig kunne bejdses med Mesurol til at repellere fugle, da det kunne påvirke spireevnen.



Billede 1. Stankelbenlarver i forskellige størrelser.



Billede 2. Nærbillede af stankelbenlarve.



Billede 3. Angreb af stankelbenlarver i en vårbygmark efter græs. Bemærk, at der er mindre angreb i forageren, hvor jorden er mere fast. Tromling kan dog desværre oftest ikke give samme effekt.