



ANGREB AF FRITFLUELARVER I RUG

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt.

De sidste par uger er modtaget flere henvendelser om angreb af fritfluelarver i rug. Se foto 1. I nogle marker er der tale om ret kraftige angreb. Anden vintersæd kan også angribes, men pt. er der kun modtaget henvendelser om angreb i rug.

De angrebne planter gulner og visner i hjerteskuddet kort efter fremspiring, og bladet kan let rykkes af. Kigger man ved stængelbasis og folder bladskederne fra hinanden, fremkommer den 3-4 mm lange, lemmeløse, hvidlige til gullige larve. Foran på larven ses to sorte mundkroge. Se foto 2-3.

Fritfluens 3. generation flyver fra slutningen af august til hen i september. Fritfluerne kan skade ved enten at ligge æg direkte i vintersæden i 1,5-2 bladstadiet eller ved at ligge æg på spildkornplanter og græsukrudt i stubben efter forfrugten. Planter med 1,5-3 blade er attraktive for æglægning, mens der ikke lægges æg på ældre planter.

Ved pløjning af stubben bevæger larverne sig op i den nyfremspirende vintersæd. I marker med angreb i år vurderes det, at der er lagt æg på spildkornplanter og græs i stubben af forfrugten. Mange enkimbladede planter i stubben af forfrugten giver de bedste æglægningsmuligheder. Betydende angreb af fritfluer er dog relativ sjældne, og det varme vejr i år vurderes at have givet gode betingelser for æglægning på spildkorn og græs i stubben efter forfrugten. Tidligere er også set et eksempel på, at der blev afbrændt enkelte mislykkede halmballer i stubben efter forfrugten, og kun i dette område af marken kom der ikke angreb af fritfluer i den efterfølgende vintersæd.

Der er ingen muligheder for bekæmpelse af angreb i vintersæden på nuværende tidspunkt. Bekæmpelse i stubben efter forfrugten er også tvivlsom, da det er svært at ramme det rigtige tidspunkt, ligesom angreb er for sjældne til, at man vil udføre en sådan bekæmpelse. Sort jord

fra midten af august reducerer risikoen for angreb.


Ved omsåning i september med vintersæd kan der være risiko for angreb fra flere larver i jorden. Overvintring sker som larve i angrebne planter.



Billede 1. Vinterrug efter vinterrug, pløjet umiddelbart før relativ sen såning. I striberne efter mejetærskeren har der været meget spildkorn, og her er der voldsomme angreb af fritfluer. Fotograferet 11. oktober af Torben Justesen, Centrovic.



Billede 2. Angreben rugplante og 2 fritfluelarver, som er fundet i stængelbasis af 2 planter.





Billede 3. Nærbillede af fritfluelarver.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.