



STØRRE FLYVNING AF HVEDEGALMYG I NOGLE OMRÅDER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I de marker, som pt. ikke er særlig langt fremme i udviklingen (under skridning), kan bekæmpelse være aktuel.

Der er i dag modtaget meldinger om fangster over tærsklen i feromonfælder på Lolland, Tåsinge og Sønderjylland. [Se varslingsregistreringsnet](#). Indberetterne anfører, at fangsterne er gjort på et døgn i weekenden. I Sønderjylland er også aflæst fælder hos 5 landmænd, som ikke indberetter til registreringsnettet.

Hveden er modtagelig fra vækststadium 41 til 61 (begyndende skridning til begyndende blomstring), og de længst udviklede marker er nu ikke længere modtagelige. I marker, som pt. ikke er særlig langt fremme i udviklingen (under skridning), kan bekæmpelse derfor være aktuel.

Til bekæmpelse kan anvendes 0,15-0,2 kg Karate eller 0,1-0,15 l Mavrik.

KWS Cleveland er resistent mod hvedegalmyg.

Følg aflæsningerne resten af i dag og i morgen.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.