



ANGREB AF KÅLMØL I FORÅRSSÅEDE KORSBLOMSTREDE AFGRØDER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der vises symptomer på angreb

Fra Gefion og LMO har vi modtaget nedenstående billeder af angreb af kålmøllarver fra den forløbne uge. Som bekendt har der i år været kraftig flyvning af kålmøl. Se nærmere i [PlanteNyt nr.2342](#).

Forårssåede korsblomstrede afgrøder er udsatte, og der er flere meldinger om kraftige angreb. Pt. er der kun modtaget en enkelt henvendelse om angreb i vinterraps, hvor angrebene var meget svage i en mark. Følg dog udviklingen.

Billede 1-4 viser "biologisk bekæmpelse" af spildplanter af vinterraps i en mark med spinat til frø. Kålmøllarver findes nu i så stort antal i spildrapsplanter, at der inden længe kun vil være bladstilke tilbage af rapsen. Konsulenten vurderer, at ellers kraftige planter er næsten væk på 14 dage.

Billede 5-6 viser angreb af kålmøllarve på skulper af gul sennep til frøproduktion. Forud er der set angreb på bladene i marken.

Billede 7 viser angreb i vinterraps. Kun meget få blade og skulper var angrebet.

I Sverige forekom der store mængder kålmøl i 1995, 2010 og 2013, hvor der skete indflyvning mellem 20.-25. maj fra øst. Jordbruksverket i Sverige oplyser, at der i ingen af disse år blev rapporteret om problemer i vinterraps. Derimod optrådte der kraftige angreb i vårraps og andre forårssåede korsblomstrede afgrøder.

Der kan fra juli optræde yderligere 2-3 generationer af kålmøl. Vinterraps kan derfor angribes i efteråret. Jordbruksverket i Sverige oplyser, at der i de tre år med kraftig flyvning kun var svage

angreb i vinterraps i efteråret, men hold alligevel øje med udviklingen til efteråret.



Billede 1. Kun bladribber er tilbage efter kålmøllarvernes hærgen.

Foto: Lars Jørgensen, Gefion.



Billede 2. "Vinduesgnav" og talrige larver af kålmøl.

Foto: Lars Jørgensen, Gefion.





Billede 3. Nærbillede af angreb. Foto: Lars Jørgensen, Gefion.



Billede 4. De angrebne rapsplanter medfører, at spinatmarken får et hvidt skær. Foto: Lars Jørgensen, Gefion.



Billede 5. Angreb af kålmøllarve på skulpe af gul sennep til frøproduktion. Foto: Kenneth Svensson, Gefion.



Billede 6. Samme som billede 5, men angreb ugen før på bladene.
Foto: Kenneth Svensson, Gefion.





Billede 7. Angreb i vinterraps. Kun meget få blade og skulper var angrebet.
Foto: Henrik Rasmussen, LMO.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.