



VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT MATRIGON IKKE KAN ANVENDES I BLOMSTRENDE VINTERRAPS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Egenkontroller hos honningopkøbere og –grossister har vist indhold af clopyralid i honning. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på behandlingsfrister for clopyralid-holdige ukrudtsmidler.

I [Plantenyt af 28. april 2017](#) har vi opfordret til, at man er opmærksom på behandlingsfristen for [Matrigon](#) i vinterraps. Baggrunden herfor er som følger:

Danske honningopkøbere og honninggrossister har som del af deres egenkontrol i 2016 ladet foretage analyser for pesticider, bl.a. aktivstoffet clopyralid, i honning. Analyserne er foretaget på tre internationalt anerkendte laboratorier.

Firmaet bag de clopyralid-holdige ukrudtsmidler, Dow AgroSciences, oplyser at der ikke foreligger data til at foretage en videnskabeligt baseret fastlæggelse af en maksimalgrænseværdi (MRL) i EU for clopyralid i honning. I sådanne tilfælde benyttes laveste niveau for den tilgængelige analysemetode (LOQ = Limit of Quantification eller kvantifikationsgrænsen), som så benyttes som ”grænseværdi”. For clopyralid i honning er denne værdi 0,05 mg/kg.

Af 55 analyser af honning fra danske avlere blev der fundet indhold af clopyralid i 85 pct af prøverne eller 47 prøver. Indholdet var over maksimalgrænseværdien (MRL) på 0,05 mg/kg i 60 pct. af prøverne, og indholdet var over 0,1 mg/kg, som i praksis vil udløse salgsforbud, i 31 pct. af prøverne.

Fødevarestyrelsen er orienteret om de ovenfor omtalte fund. De seneste års rapporter om ”Pesticidrester i fødevarer” fra Fødevarestyrelsen viser ikke tilsvarende fund i prøver af honning på markedet. Der synes således ikke grund til bekymring over, om der er uacceptabelt indhold af clopyralid eller andre pesticider i honning, som markedsføres i Danmark.

Det er ikke fuldt afklaret, hvad årsagerne er til fund og overskridelser af MRL. Størsteparten af anvendelsen af clopyralid er til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps i det tidlige forår i form af produkterne **Galera** og **Matrigon 72 SG** – samt disses parallelprodukter. Matrigon 72 SG kan udover i raps anvendes i bederoer, rødbeder, kål og skovkulturer, og produktet har et antal godkendelser til mindre anvendelse. En mindre del af anvendelsen af clopyralid er i form af produktet **Ariane FG**, som er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i græsmarker inkl. frøgræs, hvor der kan forekomme blomstrende ukrudtsplanter.

Det formodes, at der i praksis kan være en sammenhæng mellem fundene og anvendelse af clopyralid-holdige midler på blomstrende planter – og særligt i blomstrende raps. Det har tidligere været fuldt lovligt at anvende clopyralid-holdige midler indtil 3 måneder før høst (hvorved man lovligt kunne behandle raps i begyndende blomstring), men siden introduktionen af Matrigon 72 SG på markedet i 2012 er behandlingsfristen ændret, således at den i dag for Matrigon er BBCH 55 (dvs. inden begyndende blomstring) i vinterraps.

Det er således meget vigtigt, at man som landmand er opmærksom på de ændrede godkendelsesvilkår og undlader anvendelse af Matrigon i vinterraps senere end behandlingsfristen, som er vækststadiet BBCH 55.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.