



SVAMPE- OG SKADEDYRSBEKÆMPELSE I BYG-, ÆRTE- OG BYG/ÆRTEHELSÆD

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador SC godkendt.

I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador SC godkendt.

BYGHELSÆD

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byghelsæd kan være nødvendig ved mere udbredte angreb. De samme vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme og skadedyr i korn til modenhed kan anvendes i byghelsæd. Se "[Vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn](#)" og "[Vejledende bekæmpelsestærskler for skadedyr](#)". Se også svampemidlernes effekt i "[Svampemidler i korn](#)".

Ved bekæmpelse af svampe og skadedyr i helsæd skal man være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. En oversigt over sprøjtefrister i vårbyg ses i tabel 1. Den korteste sprøjtefrist på 21 dage har Amistar og Mirador 250 SC. Af skadedyrsmidler har Cyperb 100/100 W, Cythrin 500 og Nexide CS de korteste sprøjtefrister på 21 dage.

Tabel 1. Oversigt over sprøjtefrister for svampe - og skadedyrsmidler i vårbyg

Svampemiddel	Sprøjtefrist
Amistar/Mirador 250 SC	42 dage, men 21 dage i korn til helsæd

Aproach	35 dage
Bell	35 dage
Bumper 25 EC	St. 65
Ceando	35 dage
Comet Pro	42 dage
Flexity	35 dage
Folicur Xpert	St. 61
Juventus 90	35 dage
Opera	St. 65
Orius 200 EW	St. 69/st. 65
Osiris Star	35 dage
Proline EC 250	35 dage
Proline Xpert	St. 61
Prosaro 250 EC	St. 61
Rubric/Maredo 125 SC	St. 65
Stereo 312,5 EC	45 dage
Viverda	St. 65
Skadedyrsmidler	Sprøjtefrist
Cyperb 100/100 W	21 dage
Cythrín 500	21 dage
Fastac 50	42 dage
Kaiso Sorbie	28 dage
Karate 2,5 WG	30 dage
Mavrik 2F	30 dage
Nexide CS	21 dage
Pirimor G	30 dage

I tabel 2 ses nogle af de mest udbredte vårbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme.

Tabel 2. De mest udbredte vårbygsorters modtagelighed over for svampesygdomme ([SortInfo](#)).

Sort	Brutto- merudb. Svampe- sprøjtning 10 fs. 2013-15	Meldug (-1-3)•	Bygbladplet (0-3)•	Bygrust (0-3)•	Skoldplet (0-3)•	Ramularia (0-3)•
Evergreen	2,8	-1	2	1	2	2
Quench	4,6	-1	2	3	3	3

Colombus	4,9	0	2	2	3	2
Crossway	4,9*	0	2	2	1	3
RGT Planet	5,1	0	2	2	2	2
KWS Irina	5,3	-1	0	3	2	2
Propino	5,6	2	2	2	2	2
Laurikka	6,3	0	3	2	1	2
Odyssey	6,9	-1	2	3	2	3
Sanette	7,5*	0	1	3	2	2

• 0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig og 3 er meget modtagelig. -1= mlo-resistens mod meldug.* Gennemsnit af to år.

BYG/ÆRTEHELSÆD

Kun svampemidlet Amistar/Mirador 250 SC er godkendt til brug i både korn og ærter. Sprøjtefristen er i byg/ærteheldsæd 21 dage. Amistar/Mirador 250SC har god effekt mod bygrust og nogen effekt mod bygbladplet, men har kun meget begrænset effekt mod meldug og skoldplet.

Alle skadedyrsmidler, der er godkendt i ærter (se nedenfor), er også godkendt i byg.

ÆRTEHELSÆD

Svampebekæmpelse anbefales generelt ikke i ærteheldsæd.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus er 15-20 procent angrebne planter, og ved afblomstring og fuld bælg længde over 50 procent angrebne planter.

Sprøjtefristen for Pirimor G er 3 dage. Mavrik, Fastac 50 og Karate 2,5 WG har en sprøjtefrist på 7 dage. Cyperb 100/100 W, Cythrin 500 og Nexide CS har en sprøjtefrist på 14 dage i ærter.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.