



SVAMPEBEKÆMPELSE I MAJS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Svampesygdomme i majs bekæmpes indtil sprøjtefrist, hvis over 10 pct. af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. I "risikomarker" med reduceret jordbearbejdning samt forfrugt majs anbefales bekæmpelse generelt, da risiko for angreb her er høj.

Majs kan angribes af majsøjeplet og majsbladplet. Majsøjeplet trives under kølige (ca. 14-17 °C) og fugtige forhold, mens majsbladplet trives bedst ved lidt højere temperaturer (ca. 20-26 °C) og bladfugt.

Der findes ingen varslingsstjeneste for de to svampesygdomme. I Slesvig Holsten arbejdes med en klimamodel for majsøjeplet, hvor indledende undersøgelser tyder på, at perioder med mindst 36 timer med bladfugt/over 85 pct. luftfugtighed giver infektion. Da der oftest er bladfugt om natten, øger især mange timer med nedbør om dagen risikoen for angreb. Der er især risiko for, at angrebene breder sig eksponentiel, når der er angreb på 60-70 procent af bladene, der støtter kolben. Se yderligere i [Planteavlsorientering 324](#).

RISIKOMARKER

Marker, der er mest udsatte for angreb, er:

- Marker med reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt majs, fordi smitstof af majsbladplet og majsøjeplet overlever på planterester af majs.
- Kernemajs og kolbemajs er mere udsatte for angreb end majshelsæd, fordi vækstperioden er længere, og svampene derfor har længere tid til at brede sig.

ANBEFALING

Bekæmpelse anbefales:

- i alle majsmarker med forfrugt majs og samtidig reduceret jordbearbejdning
- i øvrige marker hvis over 10 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Se billede 1
- anvend omkring 0,7 liter pr. ha Opera. Én behandling er oftest tilstrækkelig, men ved meget tidlige angreb kan en splitbehandling med 0,5 l Opera med 2-3 ugers mellemrum undtagelsesvis være aktuel
- sprøjtefristen er vækststadium 65 (fuld blomstring)
- anvend med en konventionel sprøjte omkring 200-250 liter vand og brug f.eks. en 03 (blå) eller 04 (rød) lavdriftdyse.



Billede 1. Bekæmpelse i pløjede marker anbefales, hvis over 10 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben (se pilen). I starten kan det være nødvendigt at skønne, hvor kolben bliver dannet.

GODKENDTE MIDLER OG SPRØJTEFRISTER

Opera og Comet Pro er godkendt til svampebekæmpelse i majs, hvor Opera har klaret sig bedst i forsøgene ved AU. Der må pr. vækstsæson bruges op til 1,5 l Opera hhv. 1,0 l Comet Pro pr. ha. Der anbefales ved behov 0,7 l /ha Opera. I to forsøg ved Aarhus Universitet i 2011 var der kun meget lille forskel på nettomerudbyttet med 0,75 l og 1,5 l Opera trods usædvanlig tidlige og kraftige angreb.

Beslutningen om evt. bekæmpelse skal træffes inden sprøjtefristen, som er st. 65 (fuld blomstring) for både Opera og Comet Pro. Stadium 65 forventes i år at variere fra ultimo juli til

primo august.

FORSØGSRESULTATER

Forsøg med reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt majs ("risikomarker"):

I 2008-2012 er der under disse dyrkningsforhold udført i alt 12 landsforsøg med svampebekæmpelse i kernemajs og i 2010-12 i alt 6 forsøg i majsshelsæd.

I kernemajs har 8 af 12 forsøg været rentable, og der er i gennemsnit opnået et nettomerudbytte på 3,2 hkg/ha eller ca. 350 kr./ha ved 110 kr./hkg for kernemajs. I forsøgene har været anvendt 1,125 l Opera, og omkostninger til sprøjtning er derfor lidt overvurderet.

I majsshelsæd har 4 af 6 forsøg været rentable, og der er i gennemsnit opnået et nettomerudbytte på 2,5 a.e eller 230 kr./ha ved 92 kr. for en afgrødeenhed. Merudbyttet er især opnået i 1 forsøg. I forsøgene har været anvendt 1,125 l Opera, og omkostninger til sprøjtning er derfor lidt overvurderet.

Forsøg med pløjning og forfrugt majs: Der er udført 12 landsforsøg i majsshelsæd i 2013-2015 med svampebekæmpelse under disse dyrkningsforhold. Der er ikke opnået sikre merudbytter for svampesprøjtning i forsøgene, hvor der overvejende har været svage og sene angreb af svampesygdomme. I et forsøg var der dog et sikkert men meget lavt nettomerudbytte. I forsøgene har været anvendt 0,75 l Opera.

PÅVIRKNING AF FODERVÆRDI?

Der har i forsøgene ikke kunnet påvises en sikker effekt på foderværdien ved svampesprøjtning.

SORTSFORSKELLE

Der findes endnu kun et begrænset grundlag for at skelne mellem sorterne, men hvert år bedømmes angrebene i sortsforsøgene, som ikke er behandlet mod svampesygdomme. I tabel 1 ses resultater fra sortsforsøgene i 2013-2015. Som det fremgår, er der pt. ikke grundlag for at skelne mellem sorternes modtagelighed.

Tabel 1. Oversigt over angreb i 15 landsforsøg 2013-2015. Yukon har indgået i 23 landsforsøg med kernemajssorter i 2011-2015.

Sort	Procent dækning			
	Majsøjeplet		Majsbladplet	
	Pct. dækning 2 blade over kolbe	Pct. dækning 2 blade under kolbe	Pct. dækning 2 blade over kolbe	Pct. dækning 2 blade under kolbe
Absalon	1	1	0	1

Activate	1	1	1	1
Alfastar	2	1	0	0
Amagrano	0	1	0	1
Ambition	1	1	1	1
Asgaard	1	1	0	1
Atrium	1	1	1	0
Augustus KWS	1	1	1	1
Chavoxx	2	1	0	1
Emblem	2	1	1	2
Emmerson	1	1	1	1
Fieldstar	1	1	0	1
Glory	2	2	1	1
Kainoas	0	1	1	1
Kompetens	0	1	1	1
Kubitus	(1)	(1)	(1)	(1)
LG30209	1	1	1	1
LG30211	0	0	0	0
LG30215	(2)	(1)	(1)	(1)
LG31211	(1)	(1)	(1)	(1)
Nitro	0	0	0	0
RGT Sharxx	3	3	0	1
Rubiera KWS	(1)	(1)	(1)	(1)
SY Milkytop	2	1	1	1
SY Nordicstar	(1)	(1)	(1)	(1)
Sunlite	1	1	1	1
Yukon	3	2	1	1

() = kun 2 års forsøg.

REGISTRERINGSNET I 2016

I 2016 fortsætter registreringsnettet, hvor angrebet af bladsvampe i 25 majsmarker følges. Der bedømmes hovedsagelig i pløjede majshelsædsmarker, men også i upløjede marker. Alle marker har forfrugt majs. Der bedømmes fra 4.-5. juli og ugentligt, så længe sprøjtning er muligt. Fra medio august bedømmes hver 14. dag for at se udviklingen. I markerne følges både

et sprøjtet og usprøjtet område. Udviklingen kan følges på [Varsling/registreringsnet](#).

Sprøjt et træ i dine marker

For at blive klogere anbefales det, at du både har et sprøjtet og usprøjtet træ med Opera i dine marker. Herved kan du se evt. forskel på, hvor hurtigt bladene visner. Har du flere sorter på ejendommen, anbefales dette i alle sorter.

SYMPTOMER

På billede 2-3 ses angreb af majsbladplet. På billede 4-6 ses angreb af majsøjeplet.



Billede 2. Majsbladplet. Pletterne er aflange og brune eller grå.





Billede 3. Majsbladplet. Pletterne er aflange og brune eller grå.




Billede 4. Majsøjeplet.



Billede 5. Majsøjeplet. De talrige runde brune pletter med en gul zone omkring er typiske. Symptomerne er især tydelige, når bladet holdes op mod lyset.





Billede 6. Majsøjeplet. Der er tale om angreb på samme blad, hvor bladet først er fotograferet ovenfra (øverst) og herefter fotograferet op mod lyset (nederst).

[Se video om svampesygdomme i majs.](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.