



FOREBYGGELSE AF UDVINTRINGSSVAMPE I VINTERSÆD OG FRØGRÆS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I øjeblikket er forebyggelse kun muligt i frøgræs, men grundet triazolreglerne anbefales maksimalt en randbehandling i kraftigt udviklede marker.

Der er ikke længere midler godkendt til svampebekæmpelse i vintersæd om efteråret. Hvis man har Orius med en ældre etikette, kan efterårsbehandling være tilladt.

Der er søgt om en såkaldt "mindre anvendelse" til brug af Folicur Xpert i vintersæd om efteråret, men der er endnu ikke modtaget et svar.

Der er derimod givet en "mindre anvendelse" til brug af Folicur EW 250 om efteråret i frøgræs mod svampesygdomme. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 3057..](#)

Det er dog meget vigtigt at være opmærksom på, at brug af tebuconazol, som indgår i begge produkter, tæller meget hårdt ved efterårsbrug i lighed med brug af tebuconazol i vinterraps i efteråret. Ved efterårsbrug tæller 175 g tebuconazol svarende til 0,7 liter som 100 procent triazolmængde. Se yderligere i [PlanteNyt nr.1183.](#)

SNESKIMMEL

Sneskimmel er kun relativt sjældent et problem, men fremmes af tidlig såning, fordi kraftig plantevækst og snelag fremmer svampen. Sneskimmel angriber alle vintersædarter og frøgræs. Sneskimmel optræder ofte i markkanten, hvor der på grund af læforhold ligger sne i en længere periode i vinteren. Randbehandling kan ofte være tilstrækkelig.

I kraftigt udviklede frøgræsmarker kan senest muligt før snefald derfor anvendes Folicur EW. Der må maks. anvendes 0,7 liter pr. ha pr. vækstsæson. Anvendes der således i hele marken den maksimalt tilladte dosering på 0,7 liter Folicur EW 250 pr. ha svarende til 175 gram

tebuconazol pr. ha om efteråret, må der i samme vækstsæson, efterår/ forår ikke anvendes produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol. Det vil i praksis sige, at der ikke kan udføres svampebekæmpelse i foråret. Forebyggelse af sneskimmel i hele marken om efteråret frarådes derfor. Mod sneskimmel skal anvendes minimum 0,5 liter Folicur EW og gerne lidt mere. Hvis der bruges 0,5 liter Folicur EW om efteråret (125 g tebuconazol) i hele marken, kan der f.eks. anvendes 0,5 liter Bell eller 0,7 liter Viverda om foråret i frøgræsarter, hvor disse midler er godkendt. Comet Pro er godkendt i flere frøgræsarter og tæller ikke med i triazolregnskabet.



Billede 1. Sneskimmel i vinterbyg om foråret ved begyndende vækst.

TRÅDKØLLE

Vinterbyg kan angribes af trådkølle, som ses med års mellemrum. Angreb ses især i kraftigt udviklede marker med forfrugt vinterbyg eller kun et vinterbygfrit år. Pt. er der ingen godkendte midler, men der er som omtalt søgt mindre anvendelse til Folicur EW.





Billede 2. Sklerotier af trådkølle i vinterbyg fotograferet i foråret.

BLADSVAMPE

Det tidligere milde vejr har givet gode betingelser for angreb af diverse bladsvampe i vintersæd. Forsøg med bekæmpelse af bladsvampe om efteråret har oftest ikke været rentable. Som omtalt er der pt. ikke godkendte midler, og i givet fald ville bekæmpelse på nuværende sene tidspunkt selvfølgelig heller ikke være aktuell. Tit er angrebene forsvundet om foråret.

I engrapgræs ses tit meget rust om efteråret, som det kan være rentabelt at bekæmpe, men det er heller ikke længere aktuelt.





Billede 3. Kraftige meldugangreb i hvede fotograferet 12. oktober 2016.
Foto: Mads Brandt, LandbrugsRådgivningSyd, Løgumkloster.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.