



NYT OM SKADEGØRERE I REGISTRERINGSNETTET I MAJS OG ROER, UGE 29

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er udløst bekæmpelse af majsøjeplet i de første pløjede marker med forfrugt majs. I upløjede marker med forfrugt majs anbefales bekæmpelse generelt i vækststadium 51-65.

Bladsvampe i majs: Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 17 pløjede marker og 8 upløjede marker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb er højest i de upløjede marker, fordi smitstof af bladpletsvampe overlever på planterester af majs.

Der bedømmes i starten procent angrebne planter, men efterhånden som det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent dækning på de 2 blade over og under kolben samt på bladet, der støtter kolben. Endelig bedømmes procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. Dette skyldes, at den vejledende bekæmpelsestærskel i pløjede marker er over 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. I upløjede marker med forfrugt majs anbefales svampebekæmpelse generelt, fordi risikoen for angreb her er meget høj.

Majsøjeplet har bredt sig en del i den forløbne uge.

I de upløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i ca. 60 procent af markerne (op til 90 procent angrebne planter), og der er fundet angreb af majsbladplet i ca. 50 procent af markerne (op til 10 procent angrebne planter).

I de pløjede marker er der fundet angreb af majsøjeplet i ca. 60 procent af markerne (op til 70 procent angrebne planter), og der er fundet angreb af majsbladplet i ca. 25 procent af markerne (op til 20 procent angrebne planter).

Angrebene af majsøjeplet har også bredt sig til bladene omkring kolberne i nogle marker. Fra praksis er der også i flere tilfælde meldt om angreb af majsøjeplet på de nedre blade i både upløjede og pløjede marker.

Den vejledende bekæmpelsestærskel i pløjede marker på over 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben, er overskredet på den første pløjede lokalitet. Der er her 50 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. I yderligere 3 pløjede marker er der fundet majsøjeplet på bladet, der støtter kolben. Der var i disse marker 5 (2 marker) hhv. 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben, og angrebene var således tæt på den vejledende bekæmpelsestærskel. Der er således nu bekæmpelsesbehov i de første pløjede marker.

I de upløjede marker anbefales bekæmpelse generelt i perioden vækststadium 51-65 (hanblomsten mærkbar til fuld blomstring).

Til bekæmpelse anbefales omkring 0,7 l/ha Opera, som må anvendes frem til vækststadium 65 (fuld blomstring).

Der er ikke fundet angreb af majsrust.

Det gennemsnitlige vækststadium er 49, mens de længst udviklede marker er i vækststadium 55 (hanblomst halvt fremme).


Det nuværende fugtige vejr fremmer majsøjeplet, så følg udviklingen meget nøje.

Majshalvmøl: Der findes fortsat majshalvmøl i flere områder. Der er ikke sket en stigning i forekomsten.

Bladsvampe i sukkerroer: Første registrering er foretaget. Der er fundet rust men kun på enkelte planter og sorter ved Gedser og Møn.

Se data og yderligere kommentarer på linkene nedenfor.

- [Majshalvmøl](#)
- [Bladsvampe majs](#)
- [Bladsvampe i sukkerroer](#)





Billede 1. Begyndende angreb af majsøjeplet.



Billede 2. Samme som billede 1, men bladet er holdt op imod lyset.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.