



FØRSTE REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 35

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er endnu relativ få rapsjordlopper i de fleste marker. Hold især øje med bladnav i marker med ubejdset udsæd.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

De første aflæsninger af fangster er foretaget, og der er fundet rapsjordlopper i mange af markerne, men relativ få i de fleste tilfælde. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Bekæmpelsestidspunktet rettet mod larver er i et vist omfang fleksibelt og kan udføres fra omkring 5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober. Senere bekæmpelse kan også give væsentlig effekt, men er svingende og tilstræbes ikke.

Bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordloppers bladnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgravet bladareal.

Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i marker, hvor der er anvendt ubejdset udsæd. Sorterne Alabama, Architect og Archimedes er ubejdset mod skadedyr.

Sneglegrav ses også i år. Huller efter rapsjordlopper er oftest små runde huller inde på

bladpladen, mens snegle laver mere uregelmæssige gnav og oftest i bladrandene.

Se [data og uddybende kommentarer](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.