

TJEK FOR ANGREB AF RAPSJORDLOPPELARVER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Angrebene er tydelige nu

Vi har modtaget nedenstående fotos af angreb af rapsjordloppens larver i vinterraps. Pt. er der kun modtaget meget få meldinger om angreb.

Når bladstilke og stængler flækkes, og de brune gange og larver ses, er man ikke i tvivl om, at rapsjordlopper er årsag til angrebene. Ved kraftige angreb strækker planterne sig ikke.

Larverne kravler ud af planterne i løbet af foråret og forpupper sig senere i jorden i maj-juni.

Der er ingen muligheder for bekæmpelse om foråret.



Billede 1. Angreb af rapsjordloppens larve i venstre del af marken, som er ubehandlet mod skadedyr i efteråret. Højre halvdel er behandlet med 0,1 kg Kaiso Sorbie den 20. oktober 2016. Der har været udstationeret gule fangbakker i marken i efteråret, hvor der blev fanget tydeligt

over

den vejledende bekæmpelsestærskel. Landmanden har undladt sprøjtning omkring fangbakkerne

og har herved fået et sprøjtevindue.

Fotograferet 16. marts 2017 af Henrik Clement, Vestjysk Landboforening.



Billede 2. Nærbillede af angreb i ovenstående mark. Larvernes gnav kan ses som brune områder og huller.

Fotograferet 16. marts 2017 af Henrik Clement, Vestjysk Landboforening.





Billede 3. Nærbillede af rapsjordloppens larve i bladstilk fra tidligere år. Larven har mørkt hoved og 3 par ben forrest.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.