



OLIERÆDDIKE OG KÅLBROK

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Fremadrettet vurderes det, at ikke korsblomstrede afgrøder bør foretrækkes som efterafgrøder i sædskifter med meget raps.

Kålbrot breder sig som bekendt i mange rapsmarker. Sennep som efterafgrøde frarådes i sædskifter med raps, fordi sennep som bekendt også opformerer kålbrot meget kraftigt.

Olieræddike bliver kun i begrænset omfang angrebet af kålbrot. Se eksempler på angreb i tyske sortsforsøg med forskellige olieræddikesorter i [Artikel 141](#) og [Artikel 432](#).

I Tyskland frarådes det generelt at dyrke korsblomstrede efterafgrøder inkl. olieræddike i sædskifter med raps. Der er to årsager til dette nemlig, at korsblomstrede afgrøder kan vedligeholde smitte af flere sygdomme til raps bl.a. kransskimmel (*Verticillium longisporum*). Den anden årsag er, at man frygter, at der ved hyppig dyrkning af korsblomstrede kan udvikles nye smitteracer af kålbrot, der kan angribe olieræddike. I Tyskland er der faktisk allerede fundet et isolat af kålbrot, der har givet kraftige angreb af kålbrot i alle testede olieræddikesorter.

I Danmark har dyrkning af olieræddike i sædskifter med raps ikke hidtil været frarådet, men fremadrettet vurderes det, at ikke korsblomstrede afgrøder bør foretrækkes som efterafgrøder i sædskifter med meget raps. Årsagen til, at kålbrot har bredt sig i de danske rapsmarker, vurderes ikke at skyldes dyrkning af olieræddike som efterafgrøde, da der er mange andre vigtigere årsager til opformering af kålbrot. Hvis olieræddike bliver mere modtagelig for kålbrot, øges betydningen dog af olieræddike for opformeringen af kålbrot.

Hvis man finder meget kålbrot i marker med olieræddike, er det muligt at få smitteracen undersøgt ved Berlins universitet.





Billede 1. Fire olieræddikeplanter med varierende angreb af kålbrot fotograferet i december.



Billede 2. Angreb af kålbrot i olieræddike fotograferet i december.