



HVEDESORTERS MODTAGELIGHED FOR HVEDEBLADPLET (DTR)

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

En række hvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR) er igen i år undersøgt ved Aarhus Universitet i et forsøg med udlægning af smittet halm. De fleste sorter er mere eller mindre modtagelige. Creator og Informer blev mindst angrebet.)


HVEDEBLADPLET (DTR) I HVEDE

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har undersøgt 22 vinterhvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR). Der har været udsået et forsøg, hvor der indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser.

I forsøget er der udlagt halm smittet med hvedebladplet i efteråret 2016. Udlæggelse af smittet halm giver normalt gode muligheder for at opnå betydelige angreb. I 2017 forsøget var der kraftige angreb af DTR og næsten ingen angreb af Septoria, hvilket gjorde det lettere at bedømme angrebene af DTR. Forsøget havde heller ikke angreb af gulrust, hvilket i nogle vækstsæsoner også kan vanskeliggøre vurderingen af DTR. Forsøget er bedømt for angreb på 3 tidspunkter i vækstsæsonen.

De fleste af de dyrkede sorter er kendt som værende ret modtagelige. I årets forsøg adskilte 2 sorter sig ved at have lavere angreb nemlig Creator og Informer. Creator har også i tidligere års forsøg vist relativ god resistens. Se nærmere i [Hvedesorters modtagelighed for hvedebladplet \(DTR\)](#).

Angrebsgraden er rangordnet og vist i figur 1.



Figur 1. Angreb af hvedebladplet (DTR) på faneblad og 2. øverste blad i forsøg med udlægning af smittet halm.

I løbet af efteråret vil indgrupperingen i www.Sortinfo.dk blive opdateret med de nye resultater.