



ANGREB AF BYGFLUER I VINTERSÆD

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er fundet angreb i flere hvede- og rugmarker. Næste generation kan angribe vårhvede.

Der er den seneste uge i flere tilfælde meldt om angreb af bygfluelarver i tidligt sået vinterhvede og rug. Der vurderes at være omkring 10 procent angrebne planter i marker med mest angreb. Ved angreb er 1-2 skud pr. plante angrebet, og de uangrebne skud vil delvis kompensere for angrebene.

Det er meget karakteristisk, at stænglerne er opsvulmede og ligner små forårsløg. Larverne er 6 mm, hvide, lemmeløse og med sort mundbrod. Pupperne er samme størrelse og brune og ligner små tønder. Se billeder nedenfor.

Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt. Angreb af bygfluer er meget sjældne, men i 2016 blev der i flere tilfælde fundet angreb i vintersæd og senere i vårhvede, hvor der nogle steder optrådte tabsvoldende angreb.

Bygfluen har 2 generationer om året. Første generation angriber vintersæd om efteråret, og tidlig såning fremmer angreb. Larverne overvintrer i stråene. Angrebne skud dør ofte, men der dannes typisk nye sideskud i foråret.

Anden generation lægger æg i maj-juni og angriber vårbyg og vårhvede, som skades mere af angreb end vintersæd. Alle kornarter bortset fra havre angribes. I 2016 blev der i vårsæd kun set angreb i vårhvede.

I vårsæd ses gnav på det øverste af stænglen under bladskederne lige under akset. Jo senere såning jo større skade ses. Gennemskridningen bliver mere eller mindre hæmmet afhængig af vårsædens udviklingstrin på angrebstidspunktet. Kernerne på den ene side i akset kan også blive ødelagte. Se billede nedenfor.

Symptomerne, som de to generationer fremkalder, er således meget forskellige.

Bekæmpelse i vårsæd er vanskeligt, fordi angrebsstyrken ikke kendes, og fordi det nøjagtige flyvetidspunkt i maj-juni ikke kendes.

Se nærmere i [Angreb af bygfluer fundet i hvede](#) og i [Angreb af bygfluelarver i vårhvede](#).



Billede 1. Angreb af bygfluer fotograferet 5. april. Bemærk de tykke stængler, som ligner forårsløg.

Foto: Erik Silkjær Pedersen, Djursland Landboforening.




Billede 2. Samme som billede 1. Foto: Erik Silkjær Pedersen, Djursland Landboforening.



Billede 3. Puppe af bygfluelarve. Foto: Erik Silkjær Pedersen, Djursland Landboforening.



Billede 4. Larve af bygflue, der er tæt på at begynde forpupning. Bemærk den sorte mundbrod forrest, som ses på alle fluelarver.





Billede 5. Angreb af bygfluer i vårhvede fotograferet i juli 2016. Bemærk at både stænglerne og aksene er angrebne. Til venstre et uangrebent aks.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.