

ANGREB AF KÅLBROK I FORSKELLIGE SORTER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der var god effekt af den kålbrokresistente sort i den smittede mark.

Fra Sønderjysk Landboforening har vi netop modtaget nedenstående dronebilleder fra en vinterrapsmark med kålbrok.

Rapsen helt til venstre på billede 1 er en kålbrokresistent sort (SY Allister). Det samme gælder i den strimmel, der ligger midt i det hele.

Rapsen i de udgåede områder er en kålbrokmodtagelig sort, og samme sort er brugt til højre i billedet, hvor der ikke er kålbrok, fordi sædskiftet har været anderledes i den del af marken.


Landmanden var bekendt med smitte af kålbrok i marken og valgte derfor en kålbrokresistent sort, men anvendte en modtagelig sort, da såsæden slap op. På billede 2 kan man se, hvor såsæden slap op.

Alle kålbrokresistente vinterrapssorter indeholder samme resistensgen mod kålbrok. Der er fundet smitteracer/patotyper af kålbrok i nogle marker, som også kan angribe de resistente sorter, men i ovenstående mark har der været god effekt af den kålbrokresistente sort.





Billede 1. Hvor der er sået en kålbrotmodtagelig sort er planterne gået ud. Foto: Mark Aafjes, SLF



Billede 2. Til høre ses, hvor såsæden af den kålbrotresistente sort slap op.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, **hvis du vil vide mere om dette emne.**,
hvis du vil vide mere om dette emne.