



GULRUSTANGREB I FLERE HVEDESORTER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er fundet gulrust i mange marker med sorten Benchmark. Der er også fundet gulrust i 3 marker med Sheriff og 2 marker med Kalmar.

Det varme vejr og nedbøren har været gunstigt for gulrust. Som det fremgår af registreringsnettet, er der i den sidste uges tid meldt om mange tilfælde af gulrust i Benchmark i forskellige landsdele. Se [registreringsnettet](#) i hvede.

Hvedesorterne er som bekendt opdelt i modtagelighed for gulrust på en 0-4 skala, hvor 4 er ekstrem modtagelig og 3 er meget modtagelig. Benchmark har karakteren 3 for gulrust, og Substance har karakteren 4. Substance dyrkes kun på ca. 1 procent af hvedearealet, mens Benchmark dyrkes på ca. 25 procent af hvedearealet.

I dag er også meldt om ret udbredte gulrustangreb i en fremavlsmark med Sheriff ved Odense. Se fotos nedenfor.

I Sheriff er i dag også fundet enkelte blade med gulrust i en parcel i et forsøg ved Ørsted på Djursland samt på et par planter i en mark ved Thisted.

Ved Svendborg er i går også fundet to små reder med gulrust i en fremavlsmark med Kalmar. Se fotos nedenfor. Derudover er der i dag fundet en rede med gulrust i en parcel i et sortsforsøg med Kalmar ved Ørsted på Djursland.

Sheriff og Kalmar har karakteren 1 i modtagelighed for gulrust, hvilket betyder lidt modtagelig.

I observationsparcellerne er der bedømt gulrust på i alt 37 lokaliteter i Sheriff i de sidste 3 år, og den højest fundne dækningsprocent var 1,6 procent dækning.

I observationsparcellerne er der bedømt gulrust på i alt 25 lokaliteter i Kalmar i de sidste 2 år, og den højest fundne dækningsprocent var 1,0 procent dækning.

I smitteforsøg med forskellige smitteracer ved Aarhus Universitet (AU), er der også kun fundet meget svage angreb i de to sorter. Se nærmere i [Vinter- og vårhvedesorteres modtagelighed for gulrust](#).

Der bliver nu indsendt blade med gulrust fra Sheriff og Kalmar til Aarhus Universitet, der vil undersøge, om det er kendte smitteracer af gulrust, som optræder i de to sorter eller der evt. er tale om en ny smitterace. Resultaterne vil foreligge om ca. 3. uger. AU modtager gerne blade med gulrust ved fund i sorter, som er mindre modtagelige for gulrust (0-1 i modtagelighed). En vejledning i indsendelse af blade kan rekvireres hos Seges.



Billede 1. "Rede" af gulrust i sorten Kalmar ved Svendborg fotograferet 18. juni 2017 af Hans Kristian Abildskov, Centrovic.



Billede 2. Nærbillede af gulrust i sorten Kalmar ved Svendborg fotograferet 18. juni 2017 af Hans Kristian Abildskov, Centrovic.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

