



HAVRERØDSOT I NOGLE VINTERSÆDSMARKER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Angreb findes som forventet hovedsagelig i tidligt såede marker.

Der er de sidste par uger meldt om angreb af havrerødsot i flere vinterbygmarker og også i nogle hvedemarkers. Angreb findes som forventet hovedsagelig i tidligt såede marker. Der er overvejende meldt om svagere angreb indtil videre. Symptomerne bliver oftest tidligere synlige i vinterbyg end i hvede. I hvede ses de typiske røde bladspidser først senere i foråret.

Se billeder nedenfor.

I figur 1-2 nedenfor ses udviklingen af bladlus i registreringsnettet i efteråret 2016.





Billede 1. Begyndende angreb af havrerødsot i hvede fotograferet 4. april 2017. Marken er tidligt

sået nemlig den 28. august og er allerede i vækststadie 31-32. Der er sprøjtet med pyrethroid den 14. september. Det skønnes, at 15-20 procent af marken er angrebet, og at der skulle have været udført endnu en skadedyrssprøjtning i efteråret 2016.


Foto: Jens Richard Thyssen, LandboSyd.




Billede 2. Samme mark som billede 1 fotograferet fra en anden vinkel. Der er begyndende dværgvækst og gule blade. De røde bladspidser bliver først synlige senere i foråret.

Foto: Jens Richard Thyssen, LandboSyd.







Billede 3. Havrerødsot i vinterbyg fotograferet i tidligere år. I vinterbyg er bladene gule ved angreb af havrerødsot og bliver ikke røde som ved havrerødsot i hvede.



Figur 1. Udviklingen af bladlus i ubehandlede vinterbygmarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i efterårene 2009-2016. Bladlusene overfører havrerødsot. Årligt er der bedømt i omkring 20 marker.





Figur 2. Udviklingen af bladlus i ubehandlede vinterhvedemarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet i efterårene 2009-2016. Bladlusene overfører havrerødsot. Årligt er der bedømt i omkring 35 marker.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.