



AKTUELT OM SVAMPESYGDOMME I HESTEBØNNER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er modtaget en del meldinger om vikkeskimmel. Der er fundet chokoladeplet i 2 marker i denne uge.

Den seneste uge er der i mange tilfælde meldt om mere eller mindre udbredte angreb af vikkeskimmel (*Peronospora viciae*) i hestebønner. Se fotos. På bladene ses lyse pletter, og på bagsiden af pletterne ses svampebelægningen. Svampebelægningen kan også forekomme på bladoversiderne. Ved ældre angreb bliver pletterne tit lidt mørkere og rødlige.

Svampens hvilesporer kan overleve mange år i jorden. Planterne kan angribes under fremspiring og blive systemisk angrebet og udviser herved dværgvækst. Herfra spredes sporerne med vinden over større afstande til resten af marken og andre marker. Køligt og fugtigt vejr fremmer udviklingen.

Til svampobekæmpelse i hestebønner er Orius, Signum og Amistar godkendt. Af disse midler har kun Amistar og Signum effekt mod vikkeskimmel, og effekten er desværre ret svag. Ved mere udbredte angreb kan evt. anvendes 0,4-0,5 l Amistar. Der kan evt. iblandes 0,2-0,25 l Orius.

Vikkeskimmel er mindre tabsvoldende end angreb af chokoladeplet og rust. Fra UK berettes dog om, at vikkeskimmel ved udbredte angreb også kan være ret tabsvoldende i vårhestebønner.

Der er sortsforskelle i modtageligheden overfor ærteskimmel (downy mildew). Se [recommend list fra UK](#) side 22.

ANDRE SVAMPESYGDOMME

Der er denne uge set begyndende angreb af chokoladeplet i 2 marker, mens der pt. ikke er modtaget meldinger om hestebønnebladplet og hestebønnerust.

Chokoladeplet bekæmpes ved begyndende angreb i marken. Enkeltplanter i marken kan pt. være besat med kolonier af bedebladlus. Vær opmærksom på, at bladlusangreb også kan fremkalde rødbrune nekroser, som kan minde om chokoladeplet. Se fotos.

Se også [Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner](#).






Billede 1. Vikkeskimmel fotograferet i indeværende uge af Brian Kure Hansen, LMO.



Billede 2. Vikkeskimmel fotograferet i indeværende uge af Margit Bæk Jensen, Agrinord.



Billede 3. Kraftigere angreb af ærteskimmel fra tidligere år. Pletterne bliver efterhånden mørke til rødlige.





Billede 4. Ærteskimmel. Nærbillede af billede 3. Den typiske svampebelægning ses.



Billede 5. Chokoladeplet.





Billede 6. Angreb af chokoladeplet begynder typisk på de nedre blade og breder sig opad. Her foto fra tidligere år.



Billede 7. Honningdug mv. fra bladlusangreb kan resultere i rødfarvede områder på bladene. Dette må ikke forveksles med chokoladeplet.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.