



NEDVISNING AF HESTEBØNNER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ved uensartet eller sen modning kan der være behov for at nedvisne hestebønner til foder.

Hestebønner modner fra midten af august til hen i september. Nedvisning af hestebønner til foder kan være nødvendig ved uensartet eller sen modning, der vil udskyde høsten til efter midten af september. Til nedvisning bruger du 1440 g glyphosat pr. ha svarende til eksempelvis 4 l Roundup Bio pr. ha. Tilsæt ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel. Den store grønmasse i hestebønner betyder, at det tager lang tid for afgrøden at visne og tørre, dvs. omkring 3 uger, men afhængig af vejr og vind. Vejledende skal der sprøjtes når $\frac{3}{4}$ af bælgene er sorte i størstedelen af marken, dvs. at vandindholdet i frøene er ca. 30 procent.

En sidegevinst ved at nedvisne er at genvækst af ukrudt bliver bekæmpet. Da hestebønner bliver åbne under afmodning, vil nedvisning af ukrudt oftest gøre det muligt at så vintersæd direkte i stubben.

Anvend de afdriftsreducerende dyser med 150-170 l vand pr. ha, Det giver store dråber, som trænger ned i afgrøden.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.