



SVAMPEBEKÆMPELSE I VÅRHVEDE

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Vårhvedesorterne er middel eller meget modtagelige for gulrust.

I vårhvede skal man især være opmærksom på gulrust. I tabel 1 ses en oversigt over de mest udbredte vårhvedesorters modtagelighed.

Der ser ikke ud til at være de store forskelle på sorternes modtagelighed over for Septoria, og der har typisk været svage til moderate angreb. Data for hvedebladplet og brunrust er meget begrænsede, fordi angreb har været sjældne.

I Sortinfo kan også findes oplysninger om ældre sorter, der har været afprøvet i sortsforsøg. Gå ind under vårhvede og vælg "Find sort".

Tabel 1. Vårhvedesorternes modtagelighed for meldug og gulrust. www.Sortinfo.dk.

Sort	Bruttomerud. svampebekæmpelse, hkg/ha, i alt 6 fs. 2014-16	Meldug (0-4)•	Gulrust (0-4)•	Pct. dækning gulrust, (maks. angreb)	
				10 lok. 2015	6 lok. 2016
KWS Bittern	3,4 (maks. 6,2)	2	2	3,0 (8,0)	0,6 (1,8)
Dafne	2,9 (maks. 4,6)	2	3	4,9 (30,0)	0,1 (0,3)
KWS Willow	2,8 (maks. 6,8)	0	2	1,5 (11,0)	0,2 (0,8)
Harenda	(4,0) (maks. 4,9)	-	-	-	0,07 (0,3)
Alondra	2,0 (maks. 5,5)	0	2	2,9 (13,0)	4,6 (9,0)

* 0-4 skala, hvor 4 er ekstrem modtagelig. () = kun 1 års resultater

BEKÆMPELSESTÆRSKLER

Meldug bekæmpes ved over 25 procent angrebne planter i de tidlige vækststadier.

Gulrust bekæmpes ved konstateret forekomst.

Brunrust bekæmpes ved over 25 procent angrebne planter i vækststadium 30-31 (1 knæ udviklet) og herefter ved over 10 procent angrebne planter.

Septoria. Smittetrykket af Septoria er lavere i vårhvede end i vinterhvede, og der skal flere dage med nedbør til at udløse en bekæmpelse, men det nøjagtige antal er ikke undersøgt. Behovet vurderes ud fra angrebsgraden og nedbørsforholdene. I vækststadium 45-59 (skridning) udløses en bekæmpelse, hvis der er over 10 procent planter med angreb på 3. øverste blad.

Hvedebladplet kan være et problem ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning, mens svampen er mindre hyppig i pløjede marker. Angreb er oftest svagere i vårhvede end i vinterhvede.

LØSNINGSFORSLAG

I **tabel 2** er vist løsningsforslag ved svampebekæmpelse i vårhvede. Ved aksbeskyttelsen er angivet en indsats på 30 procent normaldosering, og behandlingen er ikke delt. Der anbefales en lavere indsats i vårhvede end i vinterhvede, fordi smittetrykket af Septoria er lavere i vårhvede, og de opnåede merudbytter for svampebekæmpelse har været lavere.

Hvor der undtagelsesvis er angreb af hvedebladplet vælges Proline eller ved samtidig angreb af gulrust vælges Prosaro/Proline Xpert, hvor dosis (indhold af Proline) tilpasses smittetrykket af hvedebladplet.

MAKSIMALT ANTAL TILLADTE BEHANDLINGER

Vær opmærksom på, at der for mange af løsningerne som angivet i tabel 2 er begrænsninger på det tilladte antal behandlinger pr. vækstsæson.

TRIAZOLREGLER

Ved svampebekæmpelse skal der tages hensyn til triazolreglerne. Der er begrænsninger på den maksimalt tilladte mængde af visse triazoler. Reglerne er omfattet af krydsoverensstemmelse. Se nærmere i **PlanteNyt** nr. 1183.





Billede 1. Mange af vårhvedesorterne kan få gulrust.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, **hvis du vil vide mere om dette emne.**,
hvis du vil vide mere om dette emne.