

SVENSK PROGNOSE FOR ANGREB AF RAPSJORDLOPPER I 2017-18


STØTTET AF


Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der forventes et middel til højt bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2017. I Danmark kan det være anderledes, og forekomsten følges igen via gule fangbakker.

Jordbruksverket i Sverige har igen udarbejdet en prognose for angreb af rapsjordlopper i Skåne i 2017-2018. Prognosen er baseret på larveforekomsten i ubehandlede striber i 15 vinterrapsmarker i Skåne i foråret 2017. Se antal fundne larver pr. plante i figur 1. Rapsjordlopper optræder i cykler med kraftigere angreb med 6-7 års mellemrum. Der forventes et middel til højt bekæmpelsesbehov i efteråret 2017 i Skåne.


I Danmark har der de sidste par år ikke været så kraftige angreb af rapsjordlopper som i Sverige. I figur 2 ses forekomsten af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 1992-2016 i Danmark. På basis af disse fangster forventes ikke kraftige angreb i efteråret 2017, men da det er svært at give en prognose, bliver der i lighed med tidligere år udstationeret gule fangbakker i planteavlskonsulenterne registreringsnet, så angrebsstyrken kan vurderes.





Figur 1. Antal larver pr. plante i ubehandlede striber i vinterraps i Skåne i 1975-2017.

Kilde: [Væktskyddscentralen Alnarp](#)



Figur 2. Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i efterårene 1992 til 2016 til og med uge 41 (omregnet til fangster i de store gule fangbakker (825 cm²)).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.