



SE EFTER TRIPS I RUG, TRITICALE OG VINTERBYG VED BEGYNDENDE SKRIDNING

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved mere end 1 trips pr. bladskede.

Ved begyndende skridning af rug, tritcale og vinterbyg skal marken kontrolleres for angreb af trips. Oftest optræder der flest trips i rug og tritcale. Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb bliver bladskederne og fanebladene brune. Angreb i aksene er ikke særlig tabsvoldende.

Vurdér angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 0,5 -1 mørk trips pr. bladskede.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider og doser kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. ha Karate 2,5 WG, 0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 l pr. ha Mavrik 2F/Mavrik Vita.

Mavrik Vita er en ny formulering af Mavrik 2F med samme indhold af aktivstof. Firmaet oplyser, at effekten af Mavrik Vita og Mavrik 2F ligger på samme niveau, men Mavrik Vita er mere blandbar med mikronæringsstoffer.

Karate og Kaiso Sorbie må maksimalt anvendes 3 gange hhv. 1 gang pr. vækstsæson, mens Mavrik 2F/Mavrik Vita må anvendes 2 gange om foråret.

0,15 l pr. ha Cyperb 100/Cyperb 100 W og 0,04 l pr. ha Cythrin kan også anvendes, men markedsføres ikke længere grundet høje afgifter.

Se svenske forsøg med baggrund for bekæmpelsestærsklerne i vintersæd i [Artikel 1746](#).



Billede 1. Trips i tritcale.

Foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.



Billede 2. Trips i bladskeden.





Billede 3. To larver af trips i bladskede.



Billede 4. Brunfarvede faneblade og bladskeder efter tripsangreb.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.