



STÆNGELANGREB AF LYS BLADPLET I VINTERRAPS

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der vises symptomer på angreb

Angrebene af lys bladplet i vinterraps har i år som bekendt været meget variable, og i de fleste marker har der ikke været betydende angreb af lys bladplet. I marker, hvor der tidligere har været mere udbredte angreb af lys bladplet på bladene, ses nu angreb af lys bladplet på mange af stænglerne. For at kende symptomerne er der nedenfor vist billeder fra indeværende uge af angreb.

Som det fremgår af billederne, kan pletterne variere lidt i udseende. Kanten af de angrebne områder kan være mørkere end selve pletten, men det angrebne område kan også være mere jævnt mørk og til tider med et violet skær. Angrebene har bredt sig fra de angrebne blade til stænglerne. De visne blade bliver tit hængende i længere tid end uangrebne blade.

Angrebene kan måske forveksles med rodhalsråd (Phoma), men ved angreb af rodhalsråd ses tydelige små sorte frugtleger (pyknider) i det angrebne område.

Der er pt. ikke modtaget meldinger om angreb af lys bladplet på skulperne.





Billede 1. Angreb af lys bladplet på stængel og sideskud.



Billede 2. Angreb af lys bladplet på stængel og sideskud.




Billede 3. Angreb af lys bladplet. Bemærk de mange visne blade.





Billede 4. Lys bladplet.





Billede 5. Lys bladplet.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.