



SVAMPE- OG SKADEDYRSBEKÆMPELSE I BYG-, ÆRTE- OG BYG/ÆRTEHELSÆD

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

I byghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador 250 SC godkendt.

BYGHELSÆD

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byghelsæd kan være nødvendig ved mere udbredte angreb. De samme vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme og skadedyr i korn til modenhed kan anvendes i byghelsæd. Se "[Vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn](#)" og "[Vejledende bekæmpelsestærskler for skadedyr](#)". Se også svampemidlernes effekt i tabel 1. i "[Svampemidler i korn](#)".

Ved bekæmpelse af svampe og skadedyr i helsæd skal man være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. En oversigt over sprøjtefrister i vårbyg ses i tabel 1. Den korteste sprøjtefrist på 21 dage har Amistar og Mirador 250 SC. Af skadedyrsmidler har Kaiso Sorbie og den korteste sprøjtefrist på 28 dage.

Tabel 1. Oversigt over sprøjtefrister for svampe - og skadedyrsmidler i vårbyg.

Svampemiddel	Sprøjtefrist i vårbyg
Amistar/Mirador 250 SC	42 dage, men 21 dage i korn til helsæd
Approach	35 dage
Bell	35 dage
Bumper 25 EC	St. 65
Ceando	35 dage

Comet Pro	42 dage
Flexity	35 dage
Folicur EW 250	35 dage
Folicur Xpert	St. 61
Juventus 90	35 dage
Mirador Forte	35 dage
Opera	St. 65
Orius 200 EW	St. 69
Proline EC 250	35 dage
Proline Xpert	St. 61
Propulse	St. 61
Prosaro 250 EC	St. 61
Rubric/Maredo 125 SC	St. 65
Stereo 312,5 EC	45 dage
Viverda	St. 65
Skadedyrsmidler	Sprøjtefrist
Fastac 50	42 dage
Kaiso Sorbie	28 dage
Karate 2,5 WG	30 dage
Mavrik/Mavrik Vita	30 dage
Pirimor G	30 dage

I tabel 2 ses nogle af de mest udbredte vårbygssorters modtagelighed over for svampesygdomme.

Tabel 2. De mest udbredte vårbygssorters modtagelighed overfor svampesygdomme (www.sortInfo.dk).

Sort	Brutto- merudb. svampe- sprøjt-ning 10 fs. 2014-16	Meldug (-1-3)•	Bygbladplet (0-3)•	Bygrust (0-3)•	Skoldplet (0-3)•	Ramularia (0-3)•
Evergreen	2,8	-1 ¹⁾	2	2	2	2
Flair	3,4*	-1 ¹⁾	0	3	2	3
KWS Irina	4,4	-1	0	3	2	2
Crossway	4,4	-1 ¹⁾	2	3	1	3
Laureate	4,9	0	0	2	1	2
Propino	5,2	2	2	3	2	2
Quench	5,3	-1	2	3	3	3

RGT Planet	5,4	-1 ¹⁾	2	3	2	2
Laurikka	6,5	-1 ¹⁾	3	3	1	3
Odyssey	8,1	-1	2	3	2	3

• 0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig og 3 er meget modtagelig. -1= mlo-resistens mod meldug.

¹⁾Egenskab for mlo-resistens er oplyst af forædlerne. * Gennemsnit af to år.

BYG/ÆRTEHELSÆD

Kun svampemidlet Amistar/Mirador 250 SC er godkendt til brug i både korn og ærter. Sprøjtefristen er i byg/ærteheldsæd 21 dage. Amistar/Mirador 250SC har god effekt mod bygrust og nogen effekt mod bygbladplet, men har kun meget begrænset effekt mod meldug og skoldplet.

Alle skadedyrsmidler, der er godkendt i ærter (se nedenfor), er også godkendt i byg.

ÆRTEHELSÆD

Svampebekæmpelse anbefales generelt ikke i ærteheldsæd.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus er 15-20 procent angrebne planter, og ved afblomstring og fuld bælg længde over 50 procent angrebne planter.

Sprøjtefristen for Pirimor G er 3 dage. Mavrik/Mavrik Vita, Fastac 50 og Karate 2,5 WG har en sprøjtefrist på 7 dage.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.