



FLYVNING AF BYGFLUER

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug


Evt. bekæmpelse i vinterhvede og rug anbefales kun undtagelsesvis.

Fra Djursland Landboforening har vi netop modtaget nedenstående fotos af en bygflue samt æg, som er lagt i en tidligt sået vinterhvedemark i et kystnært område på Djursland. Ved færden i marken var det let at se flyvende bygfluer. Bygfluer har i de sidste to år været mere udbredt i visse landsdele bl.a. i visse områder på Djursland og på Lammefjorden.

Se også [Tjek vårhveden for angreb af bygfluer før høst](#) og [Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd](#).

Angreb i vintersæd er væsentlig mindre tabsvoldende end i vårsæd, og oftest kompenserer vintersæd for angrebne sideskud. Evt. bekæmpelse i vinterhvede og rug anbefales kun undtagelsesvis nemlig i tidligt såede (før ca. 15. september) hvedemarker nabo til kraftigt angrebne vårhvedemarker.

Engelske forsøg viser god effekt af en pyrethroidsprøjtning i st. 11-12 (1-2 løvblade) og ingen effekt ved sprøjtning 10 dage senere, så korrekt timing er meget vigtigt. Karate er godkendt til bekæmpelse af fluer i vintersæd.





Billede 1. Bygflue fotograferet 26. september 2017 af Michael Erlang-Nielsen, Djursland Landboforening



Billede 2. Tre bygflueæg fotograferet 26. september 2017 af Michael Erlang-Nielsen, Djursland

Landboforening

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

© 2021 - SEGES Projektsitet