



UNDERSØG OLIERÆDDIKE FOR EVT. KÅLBROK

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Djursland Landboforening har fundet angreb af kålbrot på olieræddike i to tilfælde. I et igangværende projekt undersøges udbredelsen af kålbrot i olieræddike nærmere.

Fra Djursland Landboforening har vi netop modtaget nedenstående billeder af angreb af kålbrot i olieræddike fra en mark efter hvede med olieræddike som efterafgrøde. I marken er roden undersøgt på ca. 100 olieræddikeplanter, og der er fundet knap 5 procent angrebne planter. Der er først og fremmest undersøgt planter i lavninger, hvor kålbrot trives bedst. Der er tale om en tilfældig mark, hvor der sidst har været 8 frie år mellem raps. Sædskiftet før 2004 er ikke kendt.

Djursland Landboforening har i august også udendørs udsået frø af olieræddike, sennep hhv. raps i spande med kålbrotsmittet jord fra en anden mark, hvor der blev fundet kålbrot i rapsen i 2016. I spandene blev fundet angreb af kålbrot i både olieræddike, sennep og raps.

Der er også tidligere fundet angreb af kålbrot i olieræddike. Se [Olieræddike og kålbrot](#).

STØRRE UNDERSØGELSE I OKTOBER 2017

I samarbejde mellem Seges og Sønderjysk Landboforening, LMO, VKST og Djursland Landboforening undersøges angrebet af evt. kålbrot i efterafgrøder af olieræddike i et igangværende projekt i 2017 i ca. 45 marker i slutningen af oktober. Der er her valgt marker med forholdsvis meget raps i sædskiftet. Antallet af rapsspildplanter og evt. angreb af kålbrot på spildplanter optælles også. Formålet er at vurdere, hvor stor betydning olieræddike har for opformeringen af kålbrot. Resultaterne vil blive formidlet, så snart de foreligger.

Ved evt. fund af kålbrot i olieræddike bliver angrebne planter sendt til Freie Universität Berlin, hvor smitteracerne bliver bestemt. Se yderligere i [Smitteracer af kålbrot i olieræddike](#).

RESISTENTE OLIERÆDDIKESORTER I FREMTIDEN?

Ved Freie Universität Berlin har de et igangværende projekt, der har til formål at finde resistensgener, der er effektive mod forekommende smitteracer af kålbrot. Herved kan disse gener indkrydses i nye sorter af olieræddike. Pt. er der ingen viden om evt. forskelle i de dyrkede olieræddikesorters modtagelighed for kålbrot.

Landmænd og konsulenter opfordres også til i oktober at undersøge nogle marker med olieræddike for evt. kålbrot. Træk gerne 100 planter op. Angrebne planter modtages gerne med henblik på bestemmelse af smitteracer. Til undersøgelsen skal bruges flere planter, så indsend flest mulige planter.



Billede 1. Kålbrot i olieræddike fotograferet denne uge af Charlotte L. Udsen, Djursland Landboforening





Billede 2. Kålbrot i olieræddike fotograferet denne uge af Charlotte L. Udsen, Djursland Landboforening

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.