



UKRUDT I UDLÆG AF GRÆS OG KLØVER TIL FRØ

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Skånsomme og effektive løsninger mod ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af græs og kløver til frøavl.

UDLÆG AF FRØGRÆS I VÅRBYG

Se [løsningsforslag](#).

Et middel, der har godkendelse i dækafrøden, kan anvendes i en mark med udlæg, men du skal sikre dig, at midlet er skånsomt over for udlægget. Ved anvendelser, der ikke er angivet på etiketten, kan der ikke gøres produktansvar gældende. For **Express SX** er der vejledning for udlæg af alm. og italiensk rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs. I enkelte forsøg er der set forbigående påvirkning af udlægget af Express, men uden påvirkning af udbyttet. Der anvendes op til 7,5 g Express SX + spredemiddel pr. ha i blanding med f.eks. Starane XL eller Starane 333 HL, når udlægget har to-tre blade.

Starane 333 HL har ikke udlæg på etiketten, men er lige så skånsomt som de øvrige fluroxypyrmidler. Der er efter den seneste fornyelse af godkendelserne for **Primus**, **Primus XL** og **Starane XL** åbnet for anvendelse af disse i alle slags udlæg af frøgræs. **Catch**, **Mustang forte**, **Pixxaro EC**, **Saracen**, **Cleave** og **Zypar** er også skånsomme over for alle græsser.

Diflufenican-midler, som f.eks. **DFF** er tilstrækkeligt skånsomme i udlæg af rødsvingel, rajgræs, hundegræs og strandsvingel, forudsat at frøet er dækket af 1 cm jord. DFF med 0,1-0,15 l pr. ha har nogen effekt mod enårig rapgræs, hvis der er god jordfugtighed og enårig rapgræs er under fremspiring.

Express Gold SX kan ikke anvendes, fordi skånsomheden over for græsser ikke er tilstrækkelig.

Primera Super og Foxtrot kan anvendes til at bekæmpe flyvehavre i udlæg af engsvingel og rødsvingel, men de er ikke tilstrækkelig skånsomme over for udlæg af andre frøgræsarter. Dog anses risiko for skade af rajgræs som lille.

UDLÆG AF KLØVER OG ENGRAPGRÆS TIL FRØ I VÅRBYG

Se [løsningsforslag](#).

Kløver med kimblade tåler **Fighter 480** + olie. Det åbner mulighed for en så tidlig behandling, at også ukrudtet er på kimbladstadiet. Der må anvendes op til 1,5 liter Fighter 480 pr. ha pr. år, hvor der både er kløver og græs som udlæg. Der må max. behandles én gang pr. år. Sprøjt under gode temperaturforhold - evt. på bekostning af at udsætte sprøjtningen nogle få dage.

Udlægget tåler Fighter 480 + **Stomp CS** + olie, når kløveren har udviklet 1. løvblad (spadebladet). God jordfugtighed vil forbedre effekten. Hvis Stomp CS skal bruges, skal frøene være dækket af jord, så der ikke er mulighed for direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske. **Harmony SX** bør ikke anvendes i udlæg af kløver til frø.

Rent kløverudlæg tåler **Primera Super** og **Foxtrot** anvendt mod flyvehavre, men det gør udlæg af engrapgræs ikke.

Udlæg af rødsvingel og engrapgræs i ærter

I **udlæg af rødsvingel** og i **udlæg af engrapgræs** kan eksempelvis anvendes 2 x (0,4-0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS) pr. ha. For at undgå påvirkning af udlægget skal frøene være dækket. Hverken kløver- eller græsudlæg tåler Fenix.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.