



NYT OM SKADEGØRERE I VINTERHVEDE, VÅRSÆD, ALM. RAJGRÆS TIL FRØ OG MAJS I UGE 27 I REGISTRERINGSNETTET

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Sidste registrering i korn og rajgræs er foretaget. Første registrering af bladsvampe i majs er foretaget.

VINTERHVEDE

Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel.

Septoria og brunrust har bredt sig i den forløbne uge. Mest Septoria ses i KWS Cleveland og Hereford. Mindst Septoria ses i Sheriff. Mest brunrust ses i Pistoria og Hereford.

Hvedebladplet har også bredt sig lidt i den seneste uge, men angrebene er overvejende svage i de pløjede marker.

Angrebene af bladlus er stadig overvejende svage.

VÅRBYG

Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel i marker sået til normal tid.

Bygrust og dernæst bygbladplet er fortsat mest udbredt og har igen bredt sig i den forløbne uge. Tilfælde af meget bygrust er fundet i de fleste sorter. Mest bygbladplet er fundet i Laurikka, RGT Planet, Crossway og Odyssey.

Angrebene af Ramularia har også bredt sig i den forløbne uge.

HAVRE

Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel i marker sået til normal tid.

Meldug har været mest udbredt, men havrebladplet har også bredt sig i den forløbne uge.

Angrebene af havrebladplet er dog overvejende svage.

ALM. RAJGRÆS TIL FRØ

Der skal kun holdes øje med evt. angreb af sortrust. Der er pt. ikke fundet sortrust.

Sortrust bekæmpes indtil ca. 3 uger før høst.

Dette var sidste registrering i korn og rajgræs i år. Vi takker for indberetningerne. Evt. fund af sortrust i rajgræs ønskes dog fortsat indberettet.


MAJSHALVMØL


Der er fanget majshalvmøl på flere lokaliteter.

MAJSSVAMPE


Første registrering er foretaget, og der er ingen eller svage angreb.

- Vinterhvede
- Vårbyg
- Havre
- Alm rajgræs
- Majshalvmøl
- Bladsvampe i majs






Figur 1. Udviklingen af Septoria i hvede i 2017 og i de to foregående år, NB figuren viser procent dækning på 2. øverste blad.



Figur 2. Udviklingen af brunrust i hvede i 2017 og de to foregående år, procent angrebne planter.



Figur 3. Udviklingen af hvedebladplet i 2017 og de to foregående år, procent angrebne planter.



Billede 1. Angreb af brunrust på faneblad fotograferet 3. juli på Ærø af Anders Christiansen, Centrovic. Marken er behandlet 3 gange mod svampesygdomme og sidste gang den 26. juni med et middel med effekt mod brunrust.





Billede 2. Angreb af plettypen af bygbladplet i vårbyg fotograferet 28. juni af Lars Andresen, VKST.



Billede 3. Angreb af nettypen af bygbladplet i vårbyg fotograferet 3. juli 2017.





Billede 4. Kraftige angreb af Ramularia i vårbyg fotograferet 4. juli 2017 af Kristian Elkjær, Sagro.

Billedet er taget tæt på en nabomark med vinterbyg med meget Ramularia. Angrebene i vårbygmarken aftager med øget afstand til vinterbyggen.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.