



## 8. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE I UGE 45

STØTTET AF

### Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er udløst bladlusbekæmpelse i 6 af 24 tidligt såede hvedemarker i milde områder. Bekæmpelse vurderes nu at være udført i marker med behov.

Forekomsten af bladlus følges hvert efterår ugentlig i registreringsnettet i nogle vinterhvede- og vinterbygmarker frem til og med 6.-7. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Grundet den forsinkede såning i år, har det især været vanskeligt at finde tidligt såede vinterbygmarker. Registreringsnettet gennemføres derfor i år kun i hvede, og helt enkelte marker er også sået efter 15. september.

Der er denne uge modtaget indberetninger fra 24 hvedemarker, og der er fundet bladlus i 13 af markerne. I marker med angreb er fundet 1-4 procent angrebne planter.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Som det fremgår, er der fundet 2-4 procent planter med bladlus i 6 af de 24 marker.

Fugtigt vejr er ikke nødvendigvis ensbetydende med få bladlus om efteråret. Nedbørsrige somre giver god vækst i græsser og spildkornsplanter, hvor bladlusene opholder sig efter høst.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.


Til bekæmpelse kan anvendes 0,125-0,15 l Fastac, 0,1-0,15 kg Karate, 0,05-0,075 kg Kaiso Sorbie eller 0,05-0,1 l Mavrik 2F/Vita.

Bekæmpelse vurderes nu at være udført i marker med behov.

I figur 1 er udviklingen af bladlusangreb i år sammenlignet med tidligere år.

**Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.**

Se data og yderligere kommentarer i [vinterhvede](#).



**Figur 1.** Udviklingen af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede hvedemarker i registreringsnettet i efterårene 2012 til 2017. Årligt er der bedømt i omkring 30-35 marker.

**Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.**