

FØRSTE REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 35

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

De første registreringer er udført. Pt. er det ikke aktuelt at udføre bekæmpelse rettet mod laver.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 70 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

Første registrering er udført, og der er flere steder fundet rapsjordlopper i fangbakkerne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet. Pt. er det ikke aktuelt at udføre bekæmpelse rettet mod larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Bladgnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Se [data og uddybende kommentarer](#).





Billede 1. De tidligste gnav fra de voksne rapsjordlopper ligner "skudhuller".
Fotograferet 28. august 2017 i rapsmark bejdset med Cruiser RAPS af Gitte Skovgaard Jensen,

LMO.



Billede 2. Gnav efter snegle på rapsspildplanter. Snegleangreb sker fra randen af bladene.
Vær også opmærksom på evt. snegleangreb i rapsmarkerne.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.