



2. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 36

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er endnu relativ få rapsjordløpper i de fleste marker. Hold især øje med bladnav i marker med ubejdsset udsæd.

Forekomsten af rapsjordløpper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 70 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppens larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordløpper i fremspiringsfasen. Bladnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdsset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordløpper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Hvis der optælles fra indeværende uge 36, er tærsklen på de 25 rapsjordløpper pt. kun overskredet på en enkelt lokalitet (Glenstrup ved Mariager).

Se [data og uddybende kommentarer](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

