

4. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER I UGE 38

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Der er stadig få rapsjordlopper i fangbakkerne de fleste steder. Er der mange gnav, anbefales det også at udføre bekæmpelse rettet mod larver.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 75 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Bladgnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i tørre og varme efterår lægges der mange æg.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Hvis der optælles fra uge 36 (4.-5. september), har tærsklen på de 25 rapsjordlopper pt. kun været overskredet på 4 lokaliteter (ved Mariager, Knebel, Otterup og Tølløse). Se udviklingen i år i forhold til de foregående år i figur 1 nedenfor.


Tre konsulenter har meddelt, at de finder mange gnav af rapsjordlopper i nogle marker, men ingen eller kun få rapsjordlopper i fangbakkerne i de samme marker. Hvis der er mange gnav af rapsjordlopper, anbefales bekæmpelse rettet mod larver dog også. Det vides ikke, om det

ustadige vejr er årsag til en mindre "springaktivitet" af rapsjordlopper.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Billede 1. Fangbakke til rapsjordlopper. Der er kommet 100 mm nedbør. Fotograferet 17. september 2017 af Jørgen Ravn, VKST.



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2017. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

