

5. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER I UGE 39

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Tærsklen på de 25 rapsjordløpper har indtil videre været overskredet på godt 15 procent af lokaliteterne.

Forekomsten af rapsjordløpper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 75 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppens larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordløpper i fremspiringsfasen. Bladgnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordløpper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Tærsklen på de 25 rapsjordløpper har indtil videre været overskredet på godt 15 procent af lokaliteterne. Se udviklingen i år i forhold til de foregående år i figur 1 nedenfor.


Tre konsulenter har tidligere meddelt, at de finder mange gnav af rapsjordløpper i nogle marker, men ingen eller kun få rapsjordløpper i fangbakkerne i de samme marker. Hvis der er mange gnav af rapsjordløpper, anbefales bekæmpelse rettet mod larver dog også. Det vides ikke, om det ustadige vejr har været årsag til en mindre "springaktivitet" af rapsjordløpper.

Se [data og uddybende kommentarer](#).





Billede 1. Gnav fra rapsjordlopper. Sneglene havde ædt mange af planterne, og de sidste var angrebet af rapsjordlopper. I den øvrige del af marken med normal plantebestand var de enkelte planter mindre angrebet af rapsjordlopper. Fotograferet 20. september 2017 af Kasper Holm Kristensen, LMO.



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2017. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

