

9. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER I UGE 43

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Tærsklen på de 25 rapsjordlopper har været overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. I marker med meget bladgnav anbefales også en bekæmpelse rettet mod larver.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 75 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Tærsklen på de 25 rapsjordlopper er fortsat overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. Se udviklingen i år i forhold til de foregående år i figur 1.


I flere marker er i år set kraftige bladgnav efter rapsjordlopper. Ved mange bladgnav anbefales også en bekæmpelse rettet mod larver. Flere har i år også meddelt, at de finder mange gnave af rapsjordlopper i nogle marker, men ingen eller kun få rapsjordlopper i fangbakkerne i de samme marker. Det vides ikke, om det ustadige vejr har været årsag til en mindre "springaktivitet" af rapsjordlopper.

Til bekæmpelse af larver anbefales 0,2 kg Karate eller 0,1 kg Kaiso Sorbie pr. ha. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser. Mavrik er også godkendt til formålet, men har i de sidste to års landsforsøg haft lavere effekt end Kaiso Sorbie, som Mavrik har været sammenlignet med. Kaiso Sorbie og Karate indeholder samme aktivstof.

I landsforsøgene har der været god effekt mod larver i hele oktober måned. I november kan i mildt vejr også opnås væsentlig effekt, men bekæmpelse i oktober foretrækkes.

Aflæsningen i den kommende uge er sidste aflæsning i år.

Se [data](#) og [uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2017. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.