

Indhold

- Etablering
- Markplan/sædskifte
- Gødskning
- Ukrudt
- Sygdomme
- Skadedyr
- Høst
- Udbytte
- Kilder

Spindhør dyrkes først og fremmest for at udnytte fibrene til tekstilprodukter. Blår fra tekstilproduktionen kan også indgå i en række industrielle anvendelser, såsom isolering, papir og kompositter, f.eks. spånplader. I Danmark er ingen virksomheder i stand til at forarbejde strå fra spindhør, men der er stor interesse for bæredygtige tekstiler, så måske kan spindhør få en renæssance i fremtiden. Det vil kræve at der investeres i forarbejdningsudstyr samt bygges en egentlig tekstilindustri op. I dag er det forarbejdning af spindhør til tekstile formål i bl.a. Belgien, Frankrig, Tyskland m.fl. lande. Spindhør er forskellig fra oliehr ved at producere et større udbytte af fibre af en bedre kvalitet og normalt et mindre udbytte af frø.

Frøene kan udnyttes til samme formål som frø af oliehr. Linolie kan f.eks. anvendes til maling, i lak- og fernisindustrien, til tusch og til specielle smøremidler. Presserester anvendes i foderstofindustrien.


Biproduktet hørskæver kan anvendes til kompositter, strøelse m.v.

Se B. E. Pallesen, 2016: [Hamp kan blive nordens bidrag til en bæredygtig modekultur](#), hvor spindhør også nævnes som en alternativ afgrøde til bæredygtige tekstiler.

[Til top](#)



Billede 1. Blomstrende hørmærk
Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech, TI



Billede 2. Ved anvendelse af fibre er det vigtigt at fastlægge det optimale rødningsniveau. Her benytter man farveskift af afgrøden efter en rødningskala udarbejdet af Bodil Pallesen.
Kilde: Bodil E. Pallesen
Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech, TI

[Til top](#)



Billede 3. Spindhørfrøkapsler indeholder de olieholdige frø
Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech, TI

Etablering

Lerblandede sandjorder, sandblandede lerjorder og ikke for svære lerjorde er velegnede til dyrkning af hør.

På lette sandjorder og uensartede jordtyper er det en forudsætning, at der kan vandes for at sikre en afgrøde, der er ensartet i højden. Det er af betydning, når der skal fremstilles fibre af god kvalitet til spinning og vævning. Det er af mindre betydning for kvaliteten ved fremstilling af fibre til industrielle formål, som f.eks. fibermåtter, hvor grad af rødning, fiberudbytte og fiberstyrke er vigtigere.

Humusrige lave jorder er uegnede, idet afgrøden kun vanskeligt modnes her. På meget svær lerjord kan det volde problemer at sikre en ensartet fremspiring og hermed en ensartet kvalitet af råhør.

Såbed

Spindhør bør normalt dyrkes på efterårsplojet jord med jævn overflade. Forårsbearbejdningen indskrænkes til 1-2 lette harvninger i ringe dybde og tromling inden såning. Dybere jordbearbejdning bør undgås af hensyn til udtørningsrisikoen.

[Til top](#)



Billede 4. Nyfremspiret spindhør
Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech, TI

Såtid

Såtidspunktet er midt i april, dvs. når jorden er bekvem til såbedstilberedning. Sådybden er 1-2 cm.

Udsæd og sorter

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er muligt. Der kan dispenseres for dette krav, hvis de økologiske fremavlede sorter er udsolgt eller, hvis sorterne ikke kan anvendes til det givne formål. I sidste tilfælde skal der skriftligt søges dispensation hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Bruges der konventionel udsæd, skal den være ubejdset, og derfor skal den bestilles i god tid.

På udsædslisten på internettet ([Den økologiske frødatabase](#)) findes hvert år en oversigt over udbuddet af økologisk udsæd og frø, samt en beskrivelse af de regler, der gælder for brug af udsæd på økologiske jordbrug. Man kan også få oplysninger om økologisk udsæd hos den lokale planteavlskonsulent.

Det er vigtigt at anvende sund og velspirende udsæd. Frøvægten er 7 til 8 mg. Til tekstile formål anvendes 110-120 kg udsæd pr. ha ved udsåning på almindelig kornrækkeafstand. Til andre formål end tekstiler er 90 kg tilstrækkeligt.

Se sortsliste over frø- og industriafrøder på www.sortinfo.dk

Markplan/sædskifte

Spindhør er en god sædskifteafgrøde på linie med raps. Hør stiller ingen særlige krav til sædskiftet. Det anbefales at have tre hørfri år mellem hver afgrøde. Hør er god som vekselafrøde i et kornsædskifte og i sædskifter med ærter og raps.

[Til top](#)

Gødskning

Gødning i form af husdyrgødning eller anden organisk gødning tilføres før såning. På jorder i normal gødningstilstand (Pt 2-4 og Kt 7-10) er det passende at tilføre hvad der svarer til ca. 15-20

kg fosfor og ca. 70 kg kalium pr. ha. Af hensyn til fiberudnyttelse og kvaliteten af råhørren skal kaliumforsyningen være sikret. Der anvendes 25-40 kg kvælstof pr. ha. Ved en større kvælstofmængde er der stor risiko for, at afgrøden går i leje, og dermed kan det være vanskeligt at høste afgrøden maskinelt. Det er derfor vigtigt at styre tilførslen af gylle nøje.

N-normen er 33-54 kg N afhængig af jordtype.

[Til top](#)

Ukrudt

Spindhør er en relativ dårlig konkurrent overfor ukrudt. Det er derfor væsentligt at anvende mekanisk bekæmpelse i form af ukrudtsharvning, se dyrkningsvejledning om ukrudtsharvning i vårbyg og markært. Radrensning kan også være en velegnet metode til at kontrollere ukrudt i hør.

Mekanisk bekæmpelse

Radrensning og strigling af spindhør til mekanisk bekæmpelse af ukrudt er praktiseret med held.



Billede 5. Strigling af spindhør på forsøgsgården Koldkærgård.
Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech, TI

[Til top](#)



Billede 6. Ukrudtsforsøg med radrensning af spindhør i Landsforsøg på Koldkærgård
Foto: Bodil E. Pallesen, AgroTech, TI

Sygdomme

Da hør ikke har været dyrket i et særligt stort omfang i Danmark igennem en længere årrække, vil der sandsynligvis ikke være risiko for angreb af sædskiftebetingede sygdomme.

Hørstængelplet

Hele planten kan angribes af svampen, der kort før ruskning kan forekomme i pletter i marken. Angreb ses på de enkelte planter som gråbrune pletter med en mørk rand. Angreb på små planter kan være så alvorlige, at de visner og dør. Svampen har frøsmitte og der skal derfor anvendes sund udsæd.

Hørvisnesyge

Ligner hørstængelplet, men pletterne er mere udflydende. Den fremtræder også kort før ruskning, og hele stænglen bliver grålig og med et vissent udseende. Den har som stængelplet frøsmitte, og angreb kan derfor forekomme på små planter, hvor kimbladene får rødbrune pletter, hvorfra smitten breder sig. Brug sund udsæd.

Hørstængelprik

Er nok et større problem i olieør. Angreb af denne svamp ses som store mørkegrå pletter på stænglen og blade, som falder af. Vækst og frøudvikling hæmmes. [Til top](#)

Hørrust

De rødgule sommersporehobe ses i juli på blade og kapsler. Senere fremkommer sorte skorpeagtige vintersporelejer. Svampen trænger ind i stænglen og ødelægger taverne.

Gråskimmel

Gråskimmel kan i visse år optræde ret udbredt i mange afgrøder og kan også angribe hør. Bekæmpelse kan være aktuell ved udbredte angreb.

Knoldbægersvampe og meldug

Knoldbægersvamp og meldug er også konstateret i hør.

Skadedyr

Hør kan angribes af trips, jordlopper, skyggeviklere og tæger i et omfang, der betinger en behandling.

Ved angreb af trips på nyfremspirede planter bliver bladene deforme med indrullede rande. Ved kraftige angreb ødelægges planterne totalt. Trips kan også optræde 1-2 uger før blomstring, hvor angreb forårsager misfarvning og misdannelse af blade og skud. Ved kraftige angreb på dette tidspunkt visner bladene, og skuddannelsen hæmmes. Angreb på blomsterknopper medfører reduceret frødannelse i kapslerne.

Jordlopper forekommer sjældent. Skyggeviklere og tæger kan forekomme i et begrænset omfang. De kan medføre væksthæmning og forringet frøsætning. Betydende angreb af tæger findes i reglen kun langs hegn.

Høst

Traditionelt ruskes spindhør til tekstilformål med en hørrusker, der trækker planterne op med rod, og de lægges med rod- og topende på tværs af kørselsretningen. Tidspunktet for ruskning er oftest i første halvdel af august. Indenfor en periode på 90-115 dage efter såning vil det være passende at ruske hør. Ved anvendelse til tekstil ruskes på gulmodenhedsstadiet, når 1/2-2/3 af bladene er faldet af stænglerne, og frøene i kapslerne har fået en svag brunlig farve. Herefter markrødnes afgrøden på 3-4 uger. Efter de første 5-7 dages vejring skal skåret vendes med en speciel hørvender. Herved bliver kvaliteten af råhør mere ensartet, og efter yderligere 5-7 dage presses afgrøden op med en rundballepresser med specielt udstyr, således at 2 snore rulles ind i rundballerne. Vending af skåret mere en 1 gang kan være aktuelt-afhængig af vejrforhold. Afgrøden skal være tør ved presning og opbevares tørt, indtil levering finder sted.

En alternativ høstmetode kan anvendes i spindhør, hvor spindhør skal anvendes til andre formål end tekstil. I olieør anvendes mejetærskning, enten direkte på roden eller efter skårlægning. Spindhør har en betydelig stærkere fiber end olieør, og er mere vanskelig at høste. I spindhør skal afgrøden afskæres ved skårlægning forud for mejetærskning af frø.

Knivene skal være i god stand på skårlæggere og mejetærskere. Knivbladene skal ligge tæt til fingrene. Eventuelle tværrystere over halmrysteren skal være frakoblet.

Skårlægning gennemføres ved samme modenhedsgrad som beskrevet under ruskning. Når frøene efter 6-10 dages vejring er helt brune, tærskes afgrøden.

[Til top](#)

Umiddelbart før tærskning kan skåret vendes forsigtigt med en eftermonteret siderive, hvis det er nødvendigt for tørring.

I 1999 og 2000 var det en succes at høste modne frø med ribbeskærebord, og efterfølgende afskære strået med skårlægger.

Efter frøhøst skal stråene rødnes på marken. Rødningsprocessen er nødvendig, for at taverne (fibrene) kan frigøres fra den inderste træholdige stængel. Der skal fugtighed til at starte rødningsprocessen. En vending af hørrhalmen vil medføre en mere ensartet rødning. Rødningsperiodens længde er afhængig af, om afgrøden har været skårlagt og af vejrforhold. Optimal rødning er til de fleste formål, når fibrene har skiftet farve til lysgrå eller grå.

Sammenrivning og presning kan normalt ske efter 7-14 dages forløb. Afgrøden skal være tør ved presning og opbevares tørt, indtil levering finder sted.



Billede 7. Ribbehøst af spindhør, hvor frøene frøene ribbes, og stænglerne står og rødner på marken, inden de bjerges.
Foto: Bodil Pallesen, AgroTech, TI

Udbytte

Efter ruskning er udbyttet af råhør oftest mellem 50 og 75 hkg pr. ha. Heraf kan forventes ca. 12 pct. frø (vandindhold 9 pct.) og ca. 30 pct. fibre fordelt på lang- og kortfibre.

Efter mejetærskning forventes generelt et lidt højere gennemsnitsudbytte af frø, da spildet i marken kan reduceres, fordi rødning af strået sker efter mejetærskning. Frøudbytte ligger nemt på 1000 - 1500 kg. Stråudbyttet forventes oftest at være i niveauet 3000-5000 kg pr. ha med 30-40 pct. fibre. Basis for afregning af strå er et vandindhold på 16 pct.

Kilder

Pallesen, Bodil Engberg, (1996) The quality of combine-harvested fibre flax for industrial purposes depends on the degree of retting, Industrial Crops and Products 5 (1996), 65 – 78, Elsevier.

[Til top](#)