



Faktaark

KALVE PÅ GRÆS I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER

REGLER FOR ØKOLOGISKE KALVE PÅ GRÆS

Som hovedregel skal alle økologiske dyr have adgang til afgræsning så meget som muligt i perioden fra 15. april til 1. november.

Perioden afhænger dog af vejrforhold, markernes tilstand og hensynet til dyrenes velfærd. Kalve og kvier kan tages på stald i efteråret, når vejrforholdene ikke egner sig til afgræsning, eller hvis dyrene mistrives.

Kalve under 6 måneder skal have mulighed for skygge, læ og et tørt leje. Det kan være under træer, levende hegn, i en hytte eller et skur. For alle dyr og aldersgrupper gælder, at der altid skal være adgang til frisk drikkevand. Du skal dagligt tilse alle dyrene.

Afgræsning noteres i din logbog for husdyrproduktion, hvor du også skriver dato for ud- og indbinding, samt hvilke dyr, det drejer sig om. Hvis du lukker alle dyr på græs samme dag, kan du nøjes med at skrive "alle dyr sat på græs" i logbogen.

Notér også årsagen i logbogen, hvis afgræsningen er forsinket i forhold til de generelle retningslinjer.

Kalvens alder	Kalvenes adgang til græsareal
Under 4 måneder	Der er ingen krav om, at kalvene skal på græs
4–6 måneder	Kalvene skal på græs fra 1. maj til 1. september. Dog afhængigt af vejret og dyrenes fysiske kondition
Over 6 måneder	Kalvene skal normalt på græs fra 15. april til 1. november. Dog kan ungdyr udbindes senere end malkekøerne, normalt senest 1. maj. Om efteråret kan de også tages på stald, hvis vejret er dårligt eller ved mistrivsel

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



LDP 2020



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne





FOTO: KIRSTINE F. JØRGENSEN, SEGES

› ANBEFALINGER TIL FODRING OG HÅNDBTERING AF KALVE PÅ GRÆS

PLANLÆGNING OG OPFØLGNING

- Planlæg sommerens afgræsning.
- Udbind kalvene på rene marker og undgå en permanent kalvefold.
- Skift til en ren mark ca. 15. juli for at undgå parasitter.
- Hold tæt øje med kalvenes trivsel og tegn på hoste og diarré.
- Førstegangs græssende kvier bør udsættes for moderat smitte med parasitter i den første sæson for at blive immuniseret. Det bør først ske, når kalven er ældre end 4–5 måneder.
- Ved mere end 15 pct. buskgræs bør marken afpudses.

KALVE I GRUPPER VED LAV BELÆGNINGSGRAD

- Små grupper (max 10 kalve).
- Hold gruppen lukket, så kalve med forskellig immunitet ikke blandes sammen.
- Fra udbinding i maj til foldskifte ca. 15. juli: 15–20 kalve pr. ha og tilskuds-foder.
- Resten af sæsonen: 5–10 kalve pr. ha og fortsæt med tilskuds-fodring.

FODRING UNDER AFGRÆSNING

- Suppleringsfoder er altid nødvendigt, typisk 1–1,5 kg tørstof i tilskuds-foder. Kalvene kan også have fri adgang til et fuldfoder.
- Tilskuds-foderet skal sikre energi-, protein- og mineralbehovet.
- Gradvis overgang ved foderskifte.
- Der skal altid være rene foder- og vandtrug, som er placeret, så der ikke kommer godning i.

HVAD ER EN REN MARK?

Forår

- En mark, der ikke har været afgræsset af kvæg året før og ikke har fået kvæggødning.

Fra midten af juli

- En mark, der hverken har været afgræsset eller har fået kvæggødning samme år. Typisk en mark, hvor der er taget slæt.

REAGER HVIS KALVENE VISER TEGN PÅ HOSTE, DIARRÉ ELLER MISTRIVSEL

- Tag gødningsprøver.
- Iværksæt behandling.
- Flyt kalvene til en ren mark eller på stald.

KONTAKT



Finn Strudsholm
Specialkonsulent, Kvægproduktion
Økologi Innovation
fns@seges.dk
D +45 8740 5483



Birgit Ingvorsen
Landskonsulent
Økologi Innovation
bii@seges.dk
D +45 8740 5493