

## Sortsvalg med fokus på andet end udbytte

Antallet af vinterrapsorter i forsøg og på markedet er meget stor og nærmest uoverskueligt. I Landsforsøgene® 2017 har deltaget 70 forskellige sorter. Udbyttet er en nøgelfaktor i forbindelse med sortsvalget, men der bør inddrages andre faktorer. En del af disse dyrkningsfaktorer kan registreres i forbindelse med de almindelige sortsforsøg, men man kan med fordel inddrage flere andre forhold, som er vanskelige eller umulige at belyse i almindelige forsøg. Her kan man udnytte de informationer, som forædlerne af sorterne ligger inde med. De faktorer, der umiddelbart har stor interesse afhænger af dyrkningsbetingelserne. Hvis man eksempelvis satser på at høste direkte og måske samtidig dyrker rapsen på lidt uens jord er det relevant at interessere sig for, om sorten har tendens til opspringning af skulper. En anden forskel på sorterne er om de er egnede til tidlig eller sen såning. Hvor sorter der er egnet til tidlig såning ofte udvikler sig forholdsvis langsomt om efteråret, men samtidig har de en meget begrænset tendens til stængelstrækning om efteråret, modsat gælder det for sorter, der er velegnet til sen såning, at de udvikler sig hurtigt i efteråret, men kan have tendens til stængelstrækning om efteråret. Kendskab til disse forskelle kan udnyttes til at optimere dyrkningsteknikken, og eksempelvis til at reducere behovet for vækstregulering om efteråret.