

Indikatorer (15 stk) i værktøjet 'Kvie-barometret'

Livsfase 'Nyfødt – 2 mdr.' (dækker fokuspunkter for 'Nyfødt' samt '0 mdr. – 2 mdr.')

1. **Diarré 0 - 2 uger** (Andel kalve med diarré (evt. inkl. tarmbet.); ☹ hvis flere end målet)
2. **Lungebetændelse 0 - 2 mdr.** (Andel kalve med lungebetændelse (evt. inkl. mellemøret.); ☹ hvis flere end målet)
3. **8-ugers vægt** (Andel kalve der ikke har fordoblet deres fødselsvægt ved 56 dage; ☹ hvis flere end målet)

Livsfase '2 mdr. – kønsmodenhed' (dækker fokuspunkter for '2 – 6 mdr.' samt '6 mdr. – kønsmodenhed')

4. **Lungebetændelse 2 – 6 mdr.** (Andel kalve med lungebetændelse (evt. inkl. mellemøret.); ☹ hvis flere end målet)
5. **Daglig tilvækst 2-14 mdr.** (Gns. tilvækst (g/dag); ☹ hvis afvigelse fra målet)

Livsfase 'Løbekvie'

6. **Vægt ved 1. inseminering** (Andel kvier med kropsvægt $</>$ 53-57 pct. af udvokset; ☹ hvis der er nogen)
7. **Spredning, alder 1. ins.** (Spredning om gennemsnitlige alder ved 1. ins.; ☹ hvis $>$ målet hvor standard er ? mdr.)
8. **Omløbere** (Andel kvier med flere end 3 insemineringer; ☹ hvis der er nogen)

Livsfase 'Drægtig' samt 'Kælvekvie'

9. **Spredning, alder 1. kælving** (Spredning om gennemsnitlige alder ved 1. kælving; ☹ hvis $>$ målet hvor standard er 1,5 mdr.)
10. **Vægt ved kælving** (Andel kvier med kropsvægt $</>$ 83-87 pct. af udvokset; ☹ hvis der er nogen)
11. **Dødfødte kalve** (Andel dødfødte + døde indenfor 24 timer; ☹ hvis $>$ målet hvor standard sættes af PRA)

Livsfase 'Lakterende, 0-150 dage'

12. **Celletal ved 1. yktr** (Andel med celletal større end 100.000; ☹ hvis $>$ målet)
13. **Overlevelse ved 60 dage** (Andel kvier der ikke har overlevet til 60 dage efter egen kælving; ☹ hvis $>$ målet)
14. **Ydelse i pct. af 3+** (Kg EKM 0-12 uger i pct. af ældre køers ydelsesniveau; ☹ hvis $<$ målet)
15. **Ydelse, spredning** (Spredning omkring paritetens gns. topydelse; ☹ hvis $>$ målet)