

AP1b Udvikling af viden og værktøjer til optimal management af kvier fra fødsel til 150 dage efter 1. kælvning; Yversundhed hos 1.kalvskøer Projekt: 4085, Økonomisk optimal produktion af kælvkvier	Ansvarlig	SANC
	Oprettet	15-11-2017
	Side	1 af 2

Vedr. udarbejdelse af hygiejnescorer ved besætningsbesøgene

Vejledning til hygiejnevurdering			
En vurdering af køernes tilsmudsningsgrad i form af hygiejnescoring af yver, lår og ben er udviklet så det er muligt at give en mere objektiv vurdering af hygiejneniveauet i besætningen samt en opstilling af anbefalinger. Køerne vurderes på yver, bagben og på lår og flanke og får tildelt en score mellem 1 og 4 afhængig af tilsmudsningsgraden. I mindre besætninger (<100 køer) bør alle køerne vurderes. I større besætninger (>100 køer) bør mindst 25% af køerne vurderes. Alle tre zoner (yver, bagben og lår og flanke) skal vurderes for hver ko.			
Score	Yver	Bagben	Lår og flanke
1			
2			
3			
4			
1	Ingen gødning på yver	Ingen eller meget lidt gødning på kloven og nederste del af benet	Ingen gødning på lår og flanke
2	Få gødningsstænk på yver nær patterne	Få gødningsstænk på nederste del af benet	Få gødningsstænk på lår og flanke
3	Områder med gødning på yver og patter	Områder med gødning på nederste del af benet, men stadig synlige hår	Områder med gødning på lår og flanke, men stadig med synlige hår
4	Store områder med gødning og skorpedannelse på yver og patter	Store områder med gødning og skorpedannelse langt op ad benet	Store områder med gødning og skorpedannelse

Hygiejnescore af underlag

- hele gulvarealet af boks eller bagerste halvdel af bås

Score 1:

Rent og tørt overalt

Score 2

Næsten rent og tørt med enkelte klatter eller urin fordelt på < 25 % af areal

Score 3

Rimelig tørt med gødningsforurening på 25-50 % af areal

Score 4

Fugtigt med gødningsforurening på 50-75 % af areal

Score 5

Vådt med gødningsforurening på 75-100 % af areal

Navn:

CHR

Hygiejnescore **køer** 0-150 dage pp

Besøgsdato:

CKR	Yver	Bagben	Lår og flanke	Dage efter kælving