

God forberedelse giver god start på diegivning

Fokus: Alle søer skal fravænne mange flotte grise. Der kræver, at soen er klargjort til faring og den efterfølgende diegivning.



Konklusion

Fokus på fodertildelingen til de drægtige søer, huldstyring samt tre daglige fodringer gav søerne i tre besætninger et godt udgangspunkt til den forestående diegivning.

Af Dorte Poulsgård Frandsen, seniorkonsulent

Seges Svineproduktion fulgte tre veldrevne besætninger igennem et halvt år. Fokus var på følgende:

- I: Soen klar til faring og efterfølgende diegivning
- II: Færre dødfødte ved hjælp af ændrede fodertidspunkter
- III: Håndtering af små og svage grise lige efter faring
- IV: Sofoderets kvalitet og næringsstofindhold
- V: Udfordring af soens pasningsevne

Artiklen sætter fokus på at få soen godt igennem faringen og klar til den efterfølgende diegivning.

Søernes mælkeydelse var ikke optimal, og søernes huld var ikke tilfredsstillende, når de blev sat ind i farestalden. I besætning A varierede søernes huld meget, og i både besætning B og C var søerne for fede. Alle tre besætninger havde to daglige fodringer i farestalden omkring faring.

Besætning A satte system i rygspæskanningerne, så søerne blev scannet ved ind-

sættelse i drægtighedsstalden fire uger efter løbning. Der blev lavet fire foderkurver, én kurve til gylte, tynde, normale og fede søer.

Ud fra rygspækmålet blev søerne sat på en passende foderkurve. I løbet af en cyklus havde hovedparten af søerne et rygspækmål i intervallet 16 til 19 mm ved indsættelse i farestalden.

I besætning B var søerne for fede. De drægtige søer var opstaldet i stier med ædebokse. Alle søer i stien blev fodret efter samme foderkurve, den eneste mulige løsning i denne type sti. I de sidste fire uger af drægtigheden var foderstyrken kommet op over fire FE pr. so pr. dag i jagen på at få en højere fødselsvægt.




Forsøg har vist, at fødselsvægten kan hæves marginalt, hvis drægtige søer i den sidste tredjedel af drægtigheden får 3,5 FE pr. dag, men fødselsvægten steg ikke ved at give endnu mere foder. I be-

sætningen blev fodertildelingen derfor nedjusteret til 3,5 FE pr. so pr. dag. Søerne var urolige, og 15 til 20 pct. ville ikke æde, når de blev sat ind i farestalden.

I farestalden blev foderkasserne justeret efter foderets vægtfylde og energiindhold. Foderstyrken blev tilpasset dyrenes huld ved indsættelse, og der blev skiftet fra to til tre daglige fodringer. Den tredje fodring blev lagt ind kl. 20. Alle ændringerne samt ekstra fokus på søernes adgang til vand betød, at uroen og den manglende ædelyst forsvandt fra den ene dag til den anden.

I besætning C var søerne også for fede. En kalibrering af foderstationerne viste, at foderstationerne doserede 5 til 10 procent for meget foder til de drægtige søer. Foderstationerne blev justeret, og søerne fik den ønskede fodermængde. Efter ca. tre måneder satte besætning C fine og ensartede søer ind

Antal af dødfødte grise pr. kuld i de tre besætninger (A, B, C) i perioden uge 14 til 50 i 2017. Besætning A ændrede til tre fodringer i uge 25, besætning B i uge 26, og besætning C i uge 29.





Fakta

Soen er forberedt til faring og efterfølgende diegivning, når:

- Soen har et rygpækmål på 16 til 19 mm ved indsættelse.
- Soen æder normalt og får 3,5 FE/dag helt op til faring.
- Én fodring placeres tæt på faring, så soen ikke går sukkerkold under faring.
- Soen føder sine grise levende og indenfor seks til otte timer.
- Soen har mælk i yveret.

i farestalden. E-kontrollens foderopgørelse viste i øvrigt en reduktion i sofoderforbruget på 90 FE/årsso, svarende til 100.000 kr. årligt efter, at foderstationerne blev kalibreret. Besætningen kalibrerer nu foderstationerne hver sjette uge.

I besætning C blev der etableret automatisk udløsning på foderanlægget for at kunne håndtere en aftenfodring. Desværre betød en periodisk fejl på en printplade, at nogle af foderkasserne ikke lukkede tæt, når foderanlægget blev fyldt op. I stedet dryssede foder ned i nogle af søernes fodertrug.

Foderanlægget begyndte først at køre stabilt omkring uge 42.