



MANGE ÆNDRINGER I AMISTARS FORNYEDE GODKENDELSE

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Flere godkendelser er bortfaldet, max dosering er reduceret, behandlingsfrister er ændret, og der er indført "trappedoseringer" i korn afhængig af vækststadie.

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet **Amistar** (1-172), som indeholder azoxystrobin, er blevet revurderet og er godkendt på følgende betingelser:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, gulerødder, knoldselleri, persillerod, pastinak, raps, ærter med og uden bælg, kartofler, kålroer, majroer og græsfrø, samt i jordbær i væksthuse
- Må i hvede, rug, tritcale, byg og havre ikke anvendes senere end 35 dage før høst
- Må i ærter med og uden bælg, gulerødder, knoldselleri, persillerødder, pastinak, kålroer, og majroer ikke anvendes senere end 14 dage før høst
- Må i raps ikke anvendes senere end 21 dage før høst
- Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst
- Må i jordbær i væksthuse ikke anvendes senere end 3 dage før høst
- Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
- I korn er doseringen afhængig af afgrødens vækststadie:
 - Vinter- og vårhvede: 0,4 l i stadie 31-33, 1,0 l i stadie 37-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 - Vinter- og vårbyg: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 - Tritcale og rug: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson: 1,0 l. Max to behandlinger pr. sæson og min. 14 dages interval
 - Havre: 0,4 l i stadie 30-35, 0,8 l i stadie 37-45, 1,0 l i stadie 45-69. Max dosis pr. sæson:

1,0 l.

BEMÆRKNINGER

Ved den fornyede godkendelse er godkendelsen bortfaldet for mange afgrøder herunder sukkerroer, kål (blomkål, broccoli, grønkål, hvidkål, kinakål, rosenkål, rødkål, savoykål), forårsløg, hvidløg, kepaløg, skalotteløg, purløg, porrer, bladselleri på friland og i væksthuse, persille, rucola, salat, rødbeder samt jordbær på friland.

For øvrige ændringer i anvendelsen herunder max dosering, max antal behandlinger og anvendelsestidspunkt henvises til brugsanvisningen.

Amistar med "gammel" etikette må anvendes ifølge den gamle etikette, så længe lager haves.

Amistar har flere mindre anvendelser, som vil blive genansøgt.

Se yderligere i [middeldatabasen](#).